

多年生草本，全株被毛。根圆锥形，下部分枝。茎高5—8厘米，密丛生，黄色，被白色短柔毛。叶片卵形或长圆形，长5—10毫米，宽2—5毫米，基部楔形，边缘较厚，具长缘毛，顶端具硬尖或渐尖，上面疏具与缘毛相似的棕色毛，通常无柄，有时具2—3毫米的短柄。花单生于茎顶端；花梗长5—10毫米，被白色短柔毛；萼片5，椭圆形或长圆状披针形，长7—8毫米，顶端急尖，边缘厚，具缘毛，外面疏被柔毛；花瓣5，白色，宽倒卵形或倒卵形，长9—10毫米，顶端钝圆；雄蕊10，花丝钻形，扁平，短于萼片，花药暗绿色或黑色；子房卵圆形，花柱3，线形。花期7—8月。

产我国西藏南部（亚东、错那）。生于海拔4 000—4 600米的高山草甸。锡金、尼泊尔也有。模式标本采自锡金。

39. 嫩枝无心菜（中国高等植物图鉴补编） 嫩枝蚤缀（拉汉种子植物名称）

Arenaria ramellata Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **38**: 399. 1909; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 305. 1982; 西藏植物志 **1**: 684. 1983.

多年生小草本，全株无毛。茎高4—6厘米，由下部分枝，分枝上升，略叉开，具多叶。叶片卵状披针形或披针形，长5—9毫米，基部渐狭，无柄，边缘具缘毛，顶端急尖，脉不显。花单生枝端，花梗长5—10毫米；萼片5，椭圆形或披针形，长5—6毫米，宽约2毫米，顶端钝，边缘狭膜质，具缘毛；花瓣5，白色或粉红色，倒卵形，长为萼片的1.5倍，顶端钝圆，基部具短爪；雄蕊10，长为萼片的2/3，花药淡黄色；子房卵圆形，花柱3，线形，长约5毫米。花期7月。

产我国西藏南部（亚东、泽当至隆子间的阿堆扎拉）。生于海拔4 200—5 020米的高山灌丛草甸。模式标本采自西藏（卡惹拉）。

40. 藏西无心菜（中国高等植物图鉴补编） 图版45: 1—5

Arenaria stracheyi Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 240. 1874; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **33**: 374. 1898 et l. c. **38**: 398. 1909; Hemsl. et Pears. in Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 170. 1902; W. W. Smith. et Cave in Rec. Bot. Surv. Ind. **4**: 180. 1911; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 305. 1982; 西藏植物志 **1**: 684. 1983.

矮小草本，全株无毛。茎高2—5厘米，近直立，稀疏丛生。叶片肉质，线状长圆形，长5—6毫米，宽2—3毫米，扁平，基部较狭，边缘不增厚，顶端急尖或渐尖，脉不明显。花单生茎顶端，花梗长5—8毫米，直立或顶端下倾；萼片5，狭长圆形，长4—5毫米，宽3—4毫米，近直立，顶端急尖，边缘膜质；花瓣5，白色，宽倒卵形，长为萼片的1.5—2倍，顶端钝圆；雄蕊10，长于萼片，花药绿色；子房卵圆形，花柱3，线形。蒴果卵圆形，短于宿存萼，顶端6裂；种子小，近肾形，平滑，无光泽。花果期7—8月。

产我国西藏西部。生于沼泽草甸、河漫滩、砂砾质草坡和高山碎石带，海拔3 000—5 300米。尼泊尔和印度也有。模式标本采自西藏西部（普兰，拉噶池）。