

41. 红花无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 红花蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria rhodantha Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**: 366. 1922; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 305. 1982; 西藏植物志 **1**: 683. 图 217: 16—19. 1983.

多年生草本。茎高 2—5 厘米, 纤细, 直立, 无毛, 疏丛生。叶片椭圆形、卵形或披针形, 长 5—6 毫米, 宽 2—3 毫米, 顶端急尖, 具硬尖头, 边缘较厚, 具缘毛, 稀边缘狭膜质。花单生茎顶端, 花梗长 7—15 毫米, 被腺柔毛; 萼片 5, 披针形或长圆形, 紫色或绿色, 长约 5 毫米, 宽约 2 毫米, 顶端尖或钝, 边缘及中脉均有具节纤毛; 花瓣 5, 紫红色, 倒卵形或宽倒卵形, 长 8—9 毫米, 顶端钝圆; 雄蕊短于花瓣, 花药紫红色; 子房卵圆形, 花柱 3, 线形。花期 6—7 月。

产西藏东部 (错那、加查、朗县、拉萨)、四川西部 (巴塘、理塘)。生于海拔 4 000—5 000 米的高山草甸和高山砾石带或裸岩上。尼泊尔和印度也有。模式标本采自西藏东部 (岗托)。

42. 西南无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 福氏蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria forrestii Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 181. 1912; Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**: 365. 1922; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 195. 1929; Hao in Engl.'s Bot. Jahrb. **68**: 595. 1938; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 304. 1982, in clavi; 西藏植物志 **1**: 683. 1983, p. p. — *A. glanduligera* auct., non Edgew.; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **38**: 401. 1908, p. p.

42a. 西南无心菜 (原变型) 图版 44:14

f. *forrestii*

多年生草本, 高 2—15 厘米。茎丛生, 无毛或一侧被极稀的白色柔毛。茎下部的叶鳞片状, 长 3—4 毫米, 宽 1—1.5 毫米; 茎上部的叶无毛, 叶片革质, 卵状长圆形或长圆状披针形, 长 5—12 毫米, 宽 1.5—3 毫米, 基部狭, 边缘稍硬, 具软骨质, 顶端急尖, 中脉凸起。花单生枝端; 花梗长 5—15 厘米, 侧生成行柔毛; 萼片 5, 长圆状披针形, 长 5—8 毫米, 宽 2—3 毫米, 基部狭, 边缘狭膜质, 顶端锐尖, 呈黄色; 花瓣 5, 白色或粉红色, 倒卵状椭圆形, 长 7—15 毫米, 宽 4—6 毫米, 基部狭, 呈楔形, 顶端钝圆, 有时稍平截或微凹; 雄蕊 10, 花丝纤细, 基部稍扁, 长 5—6 毫米, 花药黄色; 子房卵圆形, 稍扁, 长约 2 毫米, 含 6—8 枚胚珠, 花柱 3, 线形, 长 2.5 毫米。花期 7—8 月。

产云南西北部 (丽江、中甸)、四川西部、西藏南部和东部 (八宿、察隅)、青海东南部、甘肃南部。生于海拔 2 900—5 000 米的高山草甸、沼泽草甸和倒石堆。模式标本采自云南丽江。

42b. 粉晕无心菜 (变型) (横断山区维管植物) 玫瑰无心菜 (中国高等植物图鉴补编)、粉晕蚤缀 (拉汉种子植物名称)

f. *roseotincta* (W. W. Smith) C. Y. Wu in 横断山区维管植物 上册 402.