

73. 粉花无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 粉花蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria roseiflora Sprague in Kew Bull. 1916: 33. 1916; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 202. 1929, nom. tantum, descr. et specim. excl.; 中国高等植物图鉴补编 1: 301. 1982, p. p., in clavi; 西藏植物志 1: 679. 1983, excl. cit. syn. *Arenaria euodonta* W. W. Smith—*Moehringella roseiflora* (Sprague) Neumayer in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien. 73: 14. 1923. —*A. atuntziensis* C. Y. Wu ex L. H. Zhou var. *stenopetala* Y. W. Tsui ex L. H. Zhou in Act. Biol. Plat. Sin. 6: 27. tab. 2. fig. 1—9. 1987.

73a. 粉花无心菜 (原变型) 图版 50: 1—5

f. *roseiflora*

茎高 10—25 厘米, 紫色, 上部被褐色向外反折的极短毛和较长的开展头状腺体。基生叶叶片匙形, 长 1—2 厘米, 宽 3—5 毫米, 基部渐狭成柄, 顶端钝; 茎生叶片披针形或椭圆形, 长 7—15 毫米, 宽 2—5 毫米, 基部圆形, 无柄, 边缘从中间至顶部具缘毛, 顶端钝, 中脉在叶背面隆起, 带紫色。花单生枝端; 花梗被顶端向外反折的极短毛和较长的开展头状腺体; 萼片披针形, 长 5—10 毫米, 宽 2—3 毫米, 紫色, 基部较宽, 顶端尖, 外面被紫色腺柔毛; 花瓣粉红色, 倒卵形, 长为萼片的 2 倍, 顶端 2 浅裂, 裂片很狭, 具不整齐的 2—3 齿; 雄蕊 10, 短于萼片或稍长于萼片, 花丝紫色; 子房卵圆形, 长为萼片的一半, 花柱 2, 线形。花期 6—7 月。

产云南西北部 (中甸、德钦、贡山)。生于海拔 (2 700—) 3 300—4 100 (—4 510) 米的高山草甸、砾石流及山顶裸露地。模式标本采自邱园 (种子是 Forrest 从我国西南采集在邱园种植的)。

73b. 白粉花无心菜 (变型) (云南植物志) 图版 51: 10—11

f. *albiflora* C. Y. Wu in Fl. Yunnan. 6: 146. Addenda 835. 1995. —*A. atuntziensis* C. Y. Wu ex L. H. Zhou in Icon. Corm. Sin. Suppl. 1: 302. 1982, in clavi, nom. nud. et Act. Biol. Plat. Sin. 6: 27. tab. 1. fig. 12—13. 1987, cum var. *stenopetala* Y. W. Tsui ex L. H. Zhou

与原变型的主要区别是: 花瓣白色。

产云南西北部德钦。生于海拔 3 540—4 000 米的山坡。模式标本采自德钦白马山。

74. 女娄无心菜 (中国高等植物图鉴补编)

Arenaria melandryiformis Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 399. 1909; Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 51. 1979; 中国高等植物图鉴补编 1: 302. 1982; 西藏植物志 1: 680, 1983.

根细, 分枝, 须根纤细, 灰褐色。茎高 10—20 厘米, 被白色腺柔毛。基生叶叶片线状匙形或匙形, 长 1—2 厘米, 宽 3—5 毫米, 基部楔形, 具短柄, 顶端钝; 茎生叶片线状披针形或披针形, 基部楔形, 边缘多少具缘毛, 顶端尖。花单生于茎顶或分枝顶端; 花