

梗长1—5厘米，较粗，被腺柔毛；萼片5，披针形，长4—5毫米，顶端钝，边缘狭膜质，绿色或紫色，外面多少被腺柔毛，具不明显的3脉；花瓣5，白色，倒卵形，长为萼片的2倍，顶端全缘；雄蕊10，花丝稍长于萼片，花药黄色；子房卵形，花柱2，线形。花期6—7月。

产我国西藏南部和中部（亚东、拉萨）。生于海拔4000—4900米的山顶裸岩地和倒石滩。模式标本采自亚东春丕。

75. 无饰无心菜（中国高等植物图鉴补编） 无饰蚤缀（拉汉种子植物名称）

*Arenaria inornata* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 11: 196. 1920; 中国高等植物图鉴补编 1: 307. 1982, in clavi.

多年生小草本，高约4厘米。根圆锥形或为多数成条状肉质纺锤形，主根被鳞片。茎1—3，直立或近直立，被淡白色、黄色或黑色柔毛。叶在茎下部为鳞片状，呈覆瓦状伏贴于茎上；茎上部的叶片披针形或椭圆状披针形，长1—13毫米，宽3—4毫米，基部渐狭成柄，边缘密具缘毛或无，顶端略钝近急尖，两面无毛或几无毛，具细瘤状凸起。花单生或3朵呈聚伞状排列；苞片与叶同形而小；花梗长约1厘米，密被具关节的黑色毛；萼片5，长圆状披针形，长约5毫米，宽1—1.5毫米，顶端钝，边缘膜质，具缘毛；花瓣5，倒卵形，长约1厘米，顶端微缺，常具少数齿；雄蕊10，长于萼片，花丝无毛；子房长2毫米，花柱2，长约4毫米。花期7月。

产云南西北部（德钦白马山）。生于海拔4000—4150米的山地。模式标本采自德钦至贡山间的怒江与澜沧江分水岭。

76. 山地无心菜（新拟） 山地雪灵芝（中国高等植物图鉴补编）

*Arenaria monantha* Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 401. 1909; 中国高等植物图鉴补编 1: 300. 1982.

多年生疏丛生草本。茎高5—6厘米，下部具2行柔毛，上部具短而向下的长毛。叶片椭圆状线形，长约8毫米，顶端尖，脉不显著，边缘具缘毛，上面无毛，下面被柔毛。花单生，硬直；苞片2对簇生于花梗基部；花梗细长，多少被柔毛；萼片5，椭圆形，基部相连，边缘膜质，顶端尖，脉不明显，外面被长柔毛；花瓣5，卵圆形，白色，长为萼片的1.5倍，基部具短爪，具明显的脉纹；腺体黄绿色，隆起。花期8月。

产我国西藏（拉萨）。生于山地。模式标本采自拉萨附近。

未见到标本，以上描述根据原始记载写成。

组4. 大雌蕊组 Sect. *Macrogyne* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 432. 1885; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 317. 1934.

一年生或多年生矮小、铺散草本，被毛。花瓣顶端2浅裂或微凹，有时全缘，与萼片对生的花丝基部具腺体，花柱2，稀3，长于萼片；种子圆形或肾形，平滑或具瘤状凸