

起。

我国有 5 种 3 变种，分布于西南地区。

77. 长柱无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 长柱蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria longistyla Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 433. 1886 et Pl. Delav. 96. tab. 24b. 1889; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **33**: 432. 1898; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 457. 1905; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 182. 1912; Hand. -Mazz., Symb. Sin. **7**: 196. 1929; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 302. 1982, in clavi.

77a. 长柱无心菜 (原变种) 图版 51: 5—9

var. *longistyla*

矮小草本。根细，多头。茎细，高 4—5 厘米，被 2 行柔毛或褐色腺柔毛。叶片长圆状线形或线状披针形，长 0.5—1.5 厘米，宽 1—2 毫米，基部较宽，连合呈鞘状，边缘被稀疏的缘毛，顶端具短尖头。花腋生；花梗长 2—5 厘米，被腺柔毛；萼片 5，披针形，长约 5 毫米，宽 1—1.5 毫米，基部在花期后呈囊状，边缘白色，宽膜质，顶端急尖，具短尖头，外面被腺柔毛或无毛；花瓣白色，倒卵状长圆形，长 5—6 毫米，顶端钝圆；雄蕊稍短于花瓣，花丝钻形，无毛，花药黄色，近球形；子房近球形，长约 2 毫米，花柱 2，长 6—7 毫米，钻形。花期 6—7 月。

产云南西北部 (丽江、中甸)、四川西部、西藏东南部 (隆子)。生于海拔 3 600—5 000 米的林缘和高山草甸。模式标本采自云南丽江。

77b. 棱长柱无心菜 (变种)

var. *eugonophylla* Fernald in Rhodora **21**: 5. 1919.

与长柱无心菜 (原变种) 的区别：叶片狭细，宽不足 1 毫米；花梗极细而长，长 2—4 厘米。

产云南西北部 (维西、中甸、德钦)、四川西南部 (木里、稻城、乡城)。生于海拔 2 800—4 500 米的山坡草地。模式标本采自云南西北部。

77c. 侧长柱无心菜 (变种)

var. *pleurogynoides* Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 182. 1912; Hand. -Mazz., Symb. Sin. **7**: 196. 1929.

与长柱无心菜 (原变种) 的区别：植株高大，高 7.5—10 厘米；叶片长 1.2—2 厘米；花梗长 7—6 毫米；萼片长 6—7 毫米；花瓣长达 1 厘米；花柱较短，长 5—6 毫米。

产云南西北部 (丽江、中甸)、西藏东南部 (隆子)。生于海拔 (3 170—) 3 900—4 800 (—5 000) 米的高山草甸和石灰岩倒石堆。模式标本采自云南丽江。

78. 紫蕊无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 紫蕊蚤缀 (拉汉种子植物名称)

Arenaria ionandra Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 182. 1912 et l. c. **17**: 137.