

本种与云南无心菜 *A. yunnanensis* Franch. 相近, 但叶片较小, 椭圆状匙形; 花瓣长达 1 厘米。

92. 峨眉无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 图版 56: 1—5

*Arenaria omeiensis* C. Y. Wu ex L. H. Zhou in Icon. Corm. Sin. Suppl. 1: 303. 1982, in clavi, nom. nud. et in Act. Biol. Plat. Sin. 6: 30. tab. 4. fig. 1—5. 1987.

直立小草本, 高 15—20 厘米。根圆锥形, 较细, 分支。茎被节腺毛和长节毛。叶片卵形, 长 5—10 毫米, 宽 4—6 毫米, 基部较宽, 顶端钝, 中脉凸起。聚伞花序具数花; 苞片狭卵形, 长 4—5 毫米, 宽 1—2 毫米, 基部较宽, 顶端急尖, 两面被稀疏腺柔毛; 花梗长 1—2 厘米, 密被腺柔毛; 萼片长卵形, 近基部较宽, 边缘狭膜质, 顶端钝, 外面被稀疏腺柔毛; 花瓣白色, 倒卵形, 长 8—9 毫米, 基部具长爪, 顶端齿裂; 雄蕊 10, 长于萼片, 花药长圆形, 暗色; 子房卵圆形, 长约 1.5 毫米, 花柱 2, 线形, 长为子房的 2 倍。

花期 8 月。

产四川中部。生于海拔 3 100 米的丛林下。模式标本采自峨眉山 (金顶附近)。

本种与云南无心菜 *A. yunnanensis* Franch. 相近, 但茎全部被腺柔毛; 叶片卵形, 边缘不具缘毛; 花瓣齿裂而不同。

93. 黄毛无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 图版 56: 6—11

*Arenaria auricoma* Y. W. Tsui ex L. H. Zhou in Icon. Corm. Sin. Suppl. 1: 303. 1982, in clavi, nom. nud. et in Act. Biol. Plat. Sin. 6: 31. tab. 4. fig. 6—11. 1987.


多年生草本, 全株被黄白色毛。根粗壮而长, 深褐色, 具纤细支根。茎密丛生, 高约 8 厘米, 被长柔毛。叶片质厚, 卵形, 长 4—6 毫米, 宽 3—5 毫米, 基部圆形或宽楔形, 顶端钝, 两面密被黄白色细长毛, 花序下的两对叶聚生茎顶。聚伞花序具数花至多数花; 苞片与叶同形, 花梗长 3—10 毫米, 密被黄白色细毛; 萼片 5, 长圆状披针形, 长约 4 毫米, 宽约 1.5 毫米, 基部较宽, 边缘膜质, 顶端钝, 外面被黄白色细长毛; 花瓣 5, 白色, 倒卵形, 稍长于萼片, 顶端 2 裂, 裂片具 3 齿; 雄蕊 10, 5 长 5 短, 花丝线形, 无毛, 花药黄色, 背着; 子房卵圆形, 花柱 2, 线形。蒴果未成熟。花期 7—8 月。

产云南西北部。生于海拔 4 200—4 750 米的山坡砂地。模式标本采自中甸 (哈巴山)。

94. 怒江无心菜 (中国高等植物图鉴补编) 怒江蚤缀 (拉汉种子植物名称)

*Arenaria salweenensis* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 12: 194. 1920; 中国高等植物图鉴补编 1: 303. 1982, in clavi.

多年生草本, 高 12—20 厘米。根纺锤形, 较长。茎基部二歧分枝, 较密, 近直立, 被黄色或黑色有关节的长柔毛。叶片长圆状披针形, 长 3—5 厘米, 宽 5—7 毫米, 基部稍狭, 边缘狭膜质, 顶端急尖, 无毛, 上面具小凸起而粗糙, 中脉明显, 侧脉不显, 具短柄或无柄。二歧状聚伞花序具多花; 苞片与叶同形而小; 花梗长 1—1.5 厘米, 密被黑



图版 56 1—5. 峨眉无心菜 *Arenaria omiensis* C. Y. Wu ex L. H. Zhou; 1. 植株; 2. 花正面观; 3. 花侧面观; 4. 花萼; 5. 花瓣。6—11. 黄毛无心菜 *A. auricoma* Y. W. Tsui ex L. H. Zhou; 6. 植株; 7. 花; 8. 萼片背腹面; 9. 花瓣; 10. 雄蕊; 11. 雌蕊。(王颖描自王光陆、王颖原图)