

色有关节的长柔毛；萼片5，长圆形，长约5毫米，宽约1.5毫米，顶端钝，黑红色，边缘膜质，具黑色缘毛；花瓣5，白色，稍带粉红晕，倒卵形，长约1厘米，顶端微齿状裂；雄蕊10，与萼片近等长，花丝无毛；子房长约2毫米，花柱2，长约2毫米。花期8月。

产云南西南部。生于多石草地。模式标本采自怒江与恩梅开江分水岭（腾冲至岗房片马稍北，碧江以南的高黎贡山）。

未见标本，以上描述根据原始记载和模式标本照片写成。

95. **具毛无心菜**（中国高等植物图鉴补编） 具毛蚤缀（拉汉种子植物名称）

Arenaria trichophora Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 431. 1886 et Pl. Delav. 94. 1889; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 457. 1905; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 201. 1929; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 303. 1982. — *A. yunnanensis* Franch. var. *trichophora* (Franch.) Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **33**: 430. 1898.

多年生草本，高10—30厘米。根圆锥形或纺锤形。茎丛生，基部分枝或不分枝，偃卧或直立，被硬长毛并杂生腺柔毛。叶片稍厚，长圆状椭圆形或卵形，长8—20毫米，宽3—10毫米，基部较狭，中、上部的叶无柄，下部的叶具短柄，顶端钝，下面淡绿色，中脉凸起。聚伞花序具数花至多花；苞片与叶近同形，但很小；花梗长8—20毫米，密被硬毛和腺毛，直立或向下弯曲；萼片5，披针形，长5—6毫米，基部较宽，边缘白色，膜质，顶端急尖，外面被腺柔毛；花瓣5，白色，倒卵形，长为萼片的2倍，顶端缝状分裂；雄蕊10，花丝较粗，花药长圆形，黑色或黄褐色；子房卵圆形，具多数胚珠，花柱2。花期7—9月。

产云南北部（会泽、洱源、丽江、中甸、德钦、贡山）、四川西南部（木里、乡城、稻城）和西藏东南部（察隅、错那、波密、米林、林芝）。生于海拔2500—4700米的高山灌丛、流石坡、砂地和水边草地。模式标本采自云南洱源县（孟获营黑山门山）。

96. **狭叶无心菜**（云南种子植物名录） 图版57: 1—7

Arenaria yulongshanensis L. H. Zhou, nom. nov. — *A. trichophora* Franch. var. *angustifolia* Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 431. 1886 et Pl. Delav. 95. 1889; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 201. tab. 4. fig. 1. 1929, non est *A. angustifolia* McNeill. (1961). — *A. angustifolia* (Franch.) C. Y. Wu in Ind. Fl. Yunnan. **1**: 248. 1984. p. p. excl. syn. cit. specim. Maire, non McNeill (1961).

多年生草本，高10—20厘米。根圆锥形或纺锤形。茎基部分枝，偃卧或直立，被腺毛。叶片狭披针形至宽披针形，长1—2厘米，宽2—4毫米，下部渐细，顶端急尖。聚伞花序具数花至多花；苞片与叶同形，但很小；花梗长5—15毫米，密被腺毛；萼片5，披针形，长5—6毫米，基部较宽，边缘白色，膜质，顶端急尖，外面被腺毛；花瓣5，白色，倒卵形，长为萼片的2倍，顶端缝状裂；雄蕊10，花丝较粗，花药椭圆形，紫色或黑色；子房卵圆形，具多数胚珠，花柱2。蒴果短于宿存萼，2瓣裂，裂片2裂；种子扁