

种脐旁有白色、膜质种阜，有时种阜可达种子周围 1/3。

约 20 种，分布于北温带。我国有 3 种，产于东北、华北、西北、华东、华中、西南及西北。

属模式种：*M. muscosa* L.

分种检索表

1. 花瓣比萼片长 1 倍以上；叶具 1 脉。

2. 花瓣椭圆状倒卵形，比萼片长 1—1.5 倍 1. 种阜草 *M. lateriflora* (L.) Fenzl

2. 花瓣长圆状倒卵形，比萼片长 2—2.5 倍 2. 新疆种阜草 *M. umbrosa* (Bge.) Fenzl

1. 花瓣长仅及萼片 1/3 至一半；叶具 3 基出脉 3. 三脉种阜草 *M. trinervia* (L.) Clairv.

1. 种阜草 (中国高等植物图鉴) 莫石竹 (东北草本植物志) 图版 59: 1—4

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad 18, 38. 1833 et in Ledeb. Fl. Ross. 1: 371. 1842; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 9: 57. (Prim. Fl. Amur.) 1859; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 541. tab. 31. fig. 3. 1936; Ohwi, Fl. Jap. 492. 1956; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 357. табл. 34. рис. 7. 1960; 中国高等植物图鉴 1: 628. 图 1256. 1972; 东北草本植物志 3: 18. 图版 7. 图 1—5. 1975; 内蒙古植物志 2: 163. 图版 87. 1978. — *Arenaria lateriflora* L., Sp. Pl. 423. 1753; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 70. 1886.

多年生草本，高 10—20 厘米，具匍匐根状茎。茎直立，纤细，不分枝或分枝，被短毛。叶近无柄，叶片椭圆形或长圆形，长 1—2.5 厘米，宽 4—10 毫米，顶端急尖或钝，边缘具缘毛，两面均粗糙，具小凸起，下面沿中脉被短毛。聚伞花序顶生或腋生，具 1—3 朵花；花序梗细长，花梗细，长 0.5—2 厘米，密被短毛；苞片针状；花直径约 7 毫米；萼片卵形或椭圆形，长约 2 毫米，无毛，顶端钝，边缘白膜质，中脉凸起；花瓣白色，椭圆状倒卵形，顶端钝圆，比萼片长 1—1.5 倍；雄蕊短于花瓣，花丝基部被柔毛；花柱 3。蒴果长卵圆形，长 3.5—5.5 毫米，顶端 6 裂；种子近肾形，长约 1 毫米，平滑，种脐旁具白色种阜。花期 6 月，果期 7—8 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、宁夏。生于海拔 780—2 300 米的林缘。欧洲、哈萨克斯坦、俄罗斯 (西伯利亚)、土耳其、蒙古、朝鲜、日本也有，北美逸生。

2. 新疆种阜草 (新拟) 耐阴美苓草 (拉汉种子植物名称) 图版 59: 5—7

Moehringia umbrosa (Bge.) Fenzl, Vers. Darstell. Alsin. tab. ad 18, 38. 1833; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 543. tab. 31. fig. 2. 1936; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 357. табл. 34. рис. 9. 1960. — *Arenaria umbrosa* Bge. in Ledeb.



图版 59 1—4. 种阜草 *Moechringia lateriflora* Fenzl: 1. 植株一部分; 2. 花; 3. 雄蕊; 4. 种子。5—7. 新疆种阜草 *M. umbrosa* (Bge.) Fenzl: 5. 植株一部分; 6. 雄蕊; 7. 种子。8—11. 三脉种阜草 *M. trinervia* (L.) Clairv.: 8. 植株一部分; 9. 花; 10. 花萼和开裂的果实; 11. 种子。

(祁世章绘)