

状圆锥花序；萼片5，边缘膜质；花瓣5，披针形，全缘；雄蕊10，5枚退化无花药；子房1室，具3—4胚珠；花柱2。蒴果扁球形，4裂，具1粒成熟种子；种子肾形或球形，有小疣状凸起。

仅1种，分布于我国西南部和东南亚地区。

属模式种：短瓣花 *Br. calycinum* D. Don.

1. 短瓣花（中国高等植物图鉴） 抽筋藤、活抽筋、生筋藤（广西） 图版60：10—17

Brachystemma calycinum D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 216. 1825; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 235. 1874; 中国高等植物图鉴 1: 628. 图1255. 1972; 西藏植物志 1: 666. 1983. — *Arenaria nepalensis* Spreng., Syst. Veg. Car. Past. 181. 1828; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 33: 429. 1898, cum α . himalaica et β . Khasiana Williams — *Stellaria crispata* auct., non Wall. ex D. Don; C. Y. Wu in Journ. W. China Bord. Res. Soc. 16: 154. 1946.

一年生草本。茎铺散或上升，长达6米，微显4棱，无毛或上部被疏柔毛，皮易碎裂。叶片卵状披针形至披针形，长3.5—7.5厘米，宽1—1.5厘米，顶端渐尖，基部圆形或渐狭成柄状，两面无毛或被疏柔毛；叶柄长3—6毫米。聚伞状圆锥花序顶生或腋生，大型；苞片草质，披针形，被柔毛和缘毛；花梗细，长2—5毫米；萼片狭卵形，近膜质，半透明，长约5毫米，顶端钝尖；花瓣白色，披针形，全缘，长为萼片的 $1/2$ — $2/3$ ；雄蕊短，不外露；子房球形，无毛，花柱2，线形。蒴果球形，直径约2.5毫米，短于宿存萼；种子肾状球形，长、宽约1.5毫米，具凸起。花期4—7月，果期8—12月。

产广西（西部）、四川（西部）、贵州（西部）、云南（昆明、大理、潞西）、西藏（东部）。生于海拔540—2300米间的山坡草地或路旁疏林中。印度、尼泊尔、越南、老挝、柬埔寨也有。模式标本采自尼泊尔。


根药用，可强壮筋骨，治风湿和跌打损伤。

2. 沙生亚族 Subtrib. SABULININAE Aschers. et Graebn.

Aschers. et Graebn., Fl. Nordostdtsh. Flachld. 306. 1898; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 326. 1934.

萼片离生；花柱离生；蒴果室背开裂，裂齿与花柱同数；种子多数，稀1—2。

约13属。我国有3属，主要分布于北部。



图版 60 1—9. 囊种草 *Thylacospermum caespitosum* (Camb.) Schischk.: 1. 植株; 2. 花; 3. 萼片; 4. 花瓣; 5. 雄蕊; 6. 雌蕊; 7. 果实; 8. 种子; 9. 去皮种子。10—17. 短瓣花 *Brachystemma calycinum* D. Don: 10. 花枝; 11. 花; 12. 萼片; 13. 花瓣; 14. 雄蕊 (部分); 15. 雌蕊; 16. 果实; 17. 种子。(李志民绘)