

部也有。

2. 无毛漆姑草 (东北草本植物志) 漆姑草 (东北植物检索表) 图版 61: 2—4

*Sagina saginoides* (L.) Karsten, Deutsch. Fl. 539. 1882; Dalla Torre, Anl. Beobacht. Alpenpfl. 189. 1882; Steinb. in Kom. Fl. USSR 6: 472. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 202. 1939; Повлов, Фл. Сред. Сиб. 1: 414. 1957; Байтевов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 34. табл. 33. рис. 11. 1960; 东北草本植物志 3: 25. 1975; 西藏植物志 1: 659. 图版 212: 17—23. 1983. — *Spergula saginoides* L., Sp. Pl. 441. 1753. — *S. micrantha* Bge. in Ledeb. Fl. Alt. 2: 183. 1830. — *S. linnaei* Presl, Reliq. Haenk. 2: 14. 1831; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 339. 1842; Maxim. in Mél. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. 9: 32. 1873.


多年生草本，高达 7 厘米。茎密丛生，无毛。叶片狭线形或锥状，长 0.5—10 毫米，宽约 1 毫米，无毛。花单生茎顶，花后常下垂；花梗长 (0.6—) 1.5—3 厘米；萼片 5，卵状披针形，长 1.5—3 毫米，宽约 1.5 毫米，顶端钝；花瓣 5，卵形，稍短于萼片或短至 1/2；雄蕊 10，稀为 5；花柱 5。蒴果锥状卵圆形，有光泽，长 3—5 毫米，5 瓣裂；种子肾状三角形，脊具槽，长约 0.3 毫米，表面具尖瘤状凸起。花期 5—7 月，果期 7—8 月。

产内蒙古、新疆、四川 (峨眉山)、云南 (德钦, 贡山)、西藏 (错那, 波密, 吉隆)。生于石质山坡上、沼泽草甸或灌丛中，海拔 1 440 米以下，在西南 3 省见于 (2 820—) 2 850—4 200 米。欧洲、小亚细亚至印度，俄罗斯 (西伯利亚及远东地区)、哈萨克斯坦、日本和朝鲜也有。

3. 漆姑草 (本草纲目) 瓜槌草 (植物名实图考)，珍珠草 (滇南本草)，星宿草 (四川)，日本漆姑草 (东北植物检索表)，腺漆姑草 (拉汉种子植物名称) 图版 61: 5—7

*Sagina japonica* (Sw.) Ohwi in Journ. Jap. Bot. 13: 438. 1937; Kitagawa, Lineam. Fl. Manch. 201. 1939; 中国高等植物图鉴 1: 635. 图 1269. 1972; 东北草本植物志 3: 25. 图版 1. 图 6—8. 1975; 西藏植物志 1: 659. 1983. — *Spergula japonica* Sw. in Gesellsch. Nat. Freunde Berlin Neue Schrift. 3: 164. tab. 1. fig. 2. 1801. — *Sagina sinensis* Hance in Journ. Bot. 6: 46. 1868. — *S. taquetii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 350. 1912. — *S. echinosperma* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 39. 1913. — *S. procumbens* auct., non L.: Thunb., Fl. Jap. 80. 1784. — *S. linnaei* auct., non Presl; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 70. 1886. — *S. maxima* auct., non A. Gray: Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 185. 1903; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 194. 1929; Steinb. in Kom. Fl. USSR 6: 473. tab. 25. fig. 8. 1936; 江苏南部种子植物手册 263. 图 410. 1959.

一年生小草本，高 5—20 厘米，上部被稀疏腺柔毛。茎丛生，稍铺散。叶片线形，长



图版 61 1. 仰卧漆姑草 *Sagina procumbens* L. : 果实 (示果瓣开裂)。2—4. 无毛漆姑草 *S. saginoides* (L.) Karsten; 2. 植株; 3. 果实; 4. 种子。5—7. 漆姑草 *S. japonica* (Sw.) Ohwi; 5. 植株; 6. 果实; 7. 种子。8—9. 根叶漆姑草 *S. maxima* A. Gray; 8. 果实; 9. 种子。(李志民绘)