

1. 米努草 (拉汉种子植物名称)

Minuartia regeliana (Trautv.) Mattf. in Engl's Bot. Jahrb. **57** (Beibl. 126): 29. 1921; Schischk. in Kom. Fl. USSR **6**: 488. 1936. — *Alsine tenuifolia* Crantz var. *regeliana* Trautv. in Bull. Soc. Nat. Moscou no. 22. 156. 1866.

一年生小草本，高 5—10 厘米。茎单生，纤细，基部多分枝，无毛。叶片线形，长 2—10 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，基部有时扩大，具缘毛，具 5 或 3 脉。疏聚伞花序；花梗丝状，长 3—12 毫米；萼片卵状披针形或披针形，长 2.5—3.5 毫米，宽 0.5—1 毫米，具短尖头，基部稍圆，外面无毛，具 3 条绿脉，边缘白色，膜质；花瓣长圆形，比萼片短；雄蕊通常 3—10；子房宽卵圆形。蒴果长圆状卵圆形，通常长于宿存萼，稀近等长或短；种子扁圆形，褐色，长约 0.5 毫米，具小瘤状凸起。花期 4—5 月，果期 6—7 月。

产新疆 (伊宁)。生长于海拔 680 米荒地、盐碱地或草原。俄罗斯 (西伯利亚)、哈萨克斯坦、蒙古也有。模式标本采自哈萨克斯坦。

2. 大果米努草 (拉汉种子植物名称)

Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. in Meddel. om Grönland **37**: 225. 1920; Mattf. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **15**: 195. 1922; Schischk. in Kom. Fl. USSR **6**: 513. tab. 28. fig. 3. 1936. — *Arenaria macrocarpa* Pursh, Fl. Bor. Am. **1**: 318. 1814. — *Alsine macrocarpa* Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. **1**: 353. 1842.

2a. 大果米努草 (原变种)

var. **macrocarpa**

产北极地区、俄罗斯 (东西伯利亚、远东地区)。我国无分布。

2b. 长白米努草 (变种) (东北植物检索表) 图版 62: 7—13

var. **koreana** (Nakai) Hara in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 3, **6**: 43. 1952; 东北草本植物志 **3**: 16. 图版 6. 图 5—9. 1975. — *Alsine macrocarpa* (Pursh) Fenzl var. *koreana* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **32**: 36. 1918. — *Cerastium trigynum* auct., non Vill.; James in Journ. Mansh. 461. 1888; Kom. in Act. Hort. Petrop. **22** (Fl. Mansh. 2): 184. 1903. — *C. cerastiodes* auct., non (L.) Brown; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 196. 1939.

多年生草本，高 4—13 厘米，被腺毛。茎密丛生，分枝，密被枯死的老叶及新叶，分枝上升。叶簇生，叶片线形或锥状线形，长 5—15 毫米，宽约 1 毫米，近扁平，基部连合成短鞘状，顶端稍尖，有时成镰状弯曲，下面被毛，具 3 脉，边缘疏生刺状缘毛，边缘下部具稍长的多细胞毛。花单生，稀为 2 朵，向上直立；花梗长 1.5—4.5 厘米，中部具 2 草质苞片，密被腺毛；苞片的边缘白色、膜质，外部及下部边缘疏生毛；萼片线状长圆形或卵状披针形，长 4—5 毫米，宽约 2 毫米，顶端钝，外面被腺毛，具 3 脉，顶端及边缘膜质；花瓣长圆形或倒卵状长圆形，长 7—9 毫米，比萼长近 1 倍，顶端钝；雄蕊