

2. Aufl. 16c: 339. 1934. — *Coronaria* L., Gen. Pl. 135. 1737. — *Lychnis* sect. *Pseudoagrostemma* A. Br. in Flora 26: 368. 1843; Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 222. 1874.

副花冠基部扁平；萼齿钻形，扭转。

我国常见1栽培种。

1. 毛剪秋罗（拉汉种子植物名称） 毛缕（华北经济植物志要），醉仙翁（中国种子植物分类学） 图版 65: 1—5

*Lychnis coronaria* (L.) Desr. in Lam. Encycl. 3: 643. 1789; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 340. fig. 140c. 1934; 中国高等植物图鉴补编 1: 317. 图 8559. 1982. — *Agrostemma coronaria* L., Sp. Pl. 436. 1753. — *Lychnis coriacea* Moench, Meth. Pl. 709. 1794. — *Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 699. 1936.

多年生草本，高40—80厘米，全株密被灰白色绒毛。茎直立，粗壮，分枝稀疏。基生叶叶片倒披针形或椭圆形，长5—10厘米，宽1—3厘米，基部渐狭呈柄状，顶端急尖；茎生叶无柄，较小。二歧聚伞花序稀疏；花直径约25毫米，花梗粗，比花萼长2至数倍；花萼椭圆状钟形，长15—17毫米，近革质，萼齿钻形，长4—7毫米，常扭转；雌雄蕊柄短，不明显；花瓣深红色，长25—30毫米，爪倒披针形，无毛，耳缺，瓣片轮廓倒卵形，顶端微凹缺；副花冠片狭披针形，长1.5—2.5毫米；雄蕊不外露。蒴果长圆状卵形，长约15毫米；种子肾形，长约1毫米，黑褐色，具小瘤。花期5—6月，果期6—7月。

我国城市庭园栽培供观赏。欧洲南部和亚洲西部也有。模式标本采自意大利。

组2. 剪秋罗组 Sect. *Lychnis* — *Eulychnis* Ser. in DC. Prodr. 1: 385. 1824.


副花冠基部增粗；萼齿扁平，不扭转。

我国产7种。

2. 狭叶剪秋罗（东北草本植物志）

*Lychnis sibirica* L., Sp. Pl. 437. 1753; Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 583. 1842; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 9: 56 (Prim. Fl. Amur.) 1859; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 201. 1903; Gorschk. in Kom. Fl. USSR 6: 693. tab. 42. fig. 1. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 199. 1939; 东北草本植物志 3: 54. 图版 21. 图 1—3. 1975; 中国高等植物图鉴补编 1: 318. 图 8561. 1982. — *Melandrium sibiricum* A. Br. in Flora 26: 371. 1843. — *M. hailaricum* Bar. in Clav. Pl. Chin. Bor.-Orient. 64. tab. 6. fig. 1. 1959, nom. seminud.

多年生草本，高15—35厘米，全株被短柔毛。根粗壮，木质，具多头根颈。茎丛生，纤细，直立或上升。基生叶叶片线状倒披针形或长圆状倒披针形，基部渐狭成柄状，顶



图版 65 1—5. 毛剪秋罗 *Lychnis coronaria* (L.) Desr. : 1. 植株; 2. 花萼; 3. 花瓣和雄蕊; 4. 果实; 5. 种子。6—10. 皱叶剪秋罗 *L. chalcidonica* L. : 6. 花枝; 7. 花萼 (剖开); 8. 花瓣和雄蕊; 9. 果实; 10. 种子。(钱存源绘)