

兰山。

组 3. 类大爪草组 Sect. *Spergulifoliae* (Boiss.) Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 652. 1936, sine auct. comb.; Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 237. 1957. —

Silene § *Spergulifoliae* Boiss., Fl. Orient. 1: 572. 611. 1867.

多年生草本。茎直立或上升，分枝，被毛，基部常木质化。叶片线形或披针形，叶腋生不育短枝。花两性，稀单性，雌雄异株，直立，成总状圆锥花序，稀呈头状；花萼筒状棒形，被柔毛，紧贴果实，口张开，纵脉 10 条；雌雄蕊柄长；花瓣白色，2 裂，爪无毛或具毛；花柱 3；种子肾形，具短线条纹，脊具槽。

我国产 1 种 2 变种。

11. 蔓茎蝇子草 (拉汉种子植物名称) 蔓麦瓶草 (东北植物检索表)，毛萼麦瓶草 (东北草本植物志)，匍生蝇子草 (中国高等植物图鉴)，匍生鹤草 (秦岭植物志)

Silene repens Patr. in Pers. Syn. Pl. 1: 500. 1805; Bge. in Ledeb. Fl. Alt. 2: 150. 1830 et Icon. Pl. Fl. Ross. Alt. 5: tab. 425. 1834; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 208. 1842; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 9: 53 (Prim. Pl. Amur.) 1859; Franch., Pl. David. 1: 49. 1884; Maxim., Fl. Tangut. 82. 1889 et in Act. Hort. Petrop. 11: 65. 1889; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22 (Fl. Mansh. 2): 195. 1903; Rehd. et Kobuski in Journ. Arn. Arb. 14: 9. 1933; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 203. 1939; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 654. 1936; Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 238. 1957; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 383. табл. 38. рис. 2. 1960; 中国高等植物图鉴 1: 641. 图 1281. 1972; 秦岭植物志 1(2): 214. 1974; 东北草本植物志 3: 68. 图版 27. 图 7—11. 1975; Y. Z. Zhao in Act. Sci. Nat. Univ. Intramongol. 16 (4): 593. 1985. — *S. repens* Patr. α . *vulgaris* Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 208. 1842. — *S. repens* Patr. β . *angustifolia* Turcz. ex Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 11: 208. 1838, nom. nud. et l.c. 15: 579. 1842, descr.; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 161. 1896. — *S. repens* Patr. var. *latifolia* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou 15: 579. 1842; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 161. 1869; 东北草本植物志 3: 68. 图版 27. 图 12. 1975. — *S. repens* Patr. α . *typica* Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou 34(2): 560. 1861.

11a. 蔓茎蝇子草 (原变种) 图版 72: 1—5

var. *repens*

多年生草本，高 15—50 厘米，全株被短柔毛。根状茎细长，分叉。茎疏丛生或单生，不分枝或有时分枝。叶片线状披针形、披针形、倒披针形或长圆状披针形，长 2—7 厘米，宽 3—10 (—12) 毫米，基部楔形，顶端渐尖，两面被柔毛，边缘基部具缘毛，中脉明显。总状圆