

藏植物志 1: 734. 图 237. 1983.

23a. **细蝇子草** (原变种) 九头草 (全国中草药汇编), 滇瞿麦 (云南省药品标准)
图版 76: 5—9

var. *gracilicaulis*

多年生草本, 高 (15—) 20—50 厘米。根粗壮, 稍木质。茎疏丛生, 稀较密, 直立或上升, 不分枝, 稀下部具 1—2 分枝, 无毛。基生叶叶片线状倒披针形, 长 6—18 厘米, 宽 2—5 毫米, 基部渐狭成柄状, 顶端渐尖, 两面均无毛, 边缘近基部具缘毛; 茎生叶叶片线状披针形, 比基生叶小, 基部半抱茎, 具缘毛。花序总状, 花多数, 对生, 稀呈假轮生, 花梗与花萼几等长, 无毛; 苞片卵状披针形, 长 4—12 毫米, 基部合生, 具缘毛, 顶端渐尖; 花萼狭钟形, 长 8—12 毫米, 直径约 4 毫米, 无毛, 纵脉紫色, 脉端在萼齿处连合, 萼齿三角状卵形, 顶端圆钝, 边缘膜质, 白色, 具短缘毛; 雌雄蕊柄长约 2 毫米, 被短毛; 花瓣白色或灰白色, 下面带紫色, 爪倒披针形, 无毛, 耳呈三角状, 瓣片露出花萼, 2 裂达瓣片中部或更深, 裂片狭长圆形; 副花冠片小, 长圆形; 雄蕊外露, 花丝无毛; 花柱外露, 蒴果长圆状卵形, 长 6—8 毫米; 种子圆肾形, 长约 1 毫米。花期 7—8 月, 果期 8—9 月。

产青海、内蒙古、四川、云南、西藏。生于海拔 3 000—4 000 米多砾石的草地或山坡。模式标本采自四川康定。

全草或根入药。治小便不利、尿痛、尿血、经闭等症。

23b. **大花细蝇子草** (变种) (云南植物研究) 紫茎九头草 (全国中草药汇编), 癩头参 (云南)

var. *rubescens* (Franch.) C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 2: 437. 1980. —
Silene tenuis Willd. f. *rubescens* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 425. 1886. —
S. tenuis Willd. var. *rubescens* (Franch.) Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 302.
1912; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 203. 1929.

花萼长 15—18 毫米; 花瓣淡红色, 长 20—22 毫米。

产四川 (西南) 和云南。模式标本采自云南鹤庆。

根或全草入药, 功效与原变种同。

24. **长梗蝇子草** (新拟) 长梗细蝇子草 (云南植物研究)

Silene pterosperma Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 67. 1889. —*S. tenuis*
auct., non Willd. (1809): 秦岭植物志 1 (2): 214. 1974. —*S. gracilicaulis* C. L. Tang
var. *longipedicellata* C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 2: 437. fig. 6. 1980; Y. Z.
Zhao in Act. Sci. Nat. Univ. Intramongol. 16 (4): 595. 1985, syn. nov. —*S. tenuis*
Willd. var. *denudata* Y. W. Tsui et L. H. Chou in Bull. Bot. Lab. North.-East. Forest.
Inst. 9(9): 58. tab. 3: 1—3. 1980, syn. nov.