

1.5—2 毫米。花期 8—9 月。

产云南（丽江）。生于海拔 2 700—3 300 米的石灰质岩石缝中。模式标本采自丽江。

31b. 矮球萼蝇子草（变种）（新拟）图版 78: 1—4

var. *pygmaea* Bocquet in Candollea **22** (1): 19. 1967 et Phaner. Monogr. **1**: 104. tab. 3. fig. m. et tab. 32. fig. f. 1969. — *Lychnis nigrescens* Edgew. var. Edinb. Staff in Not. Bot. Gard. Edinb. **17**: 240. 1930. — *Silene graminoides* C. Y. Wu et C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. **4**: 145. fig. 1: 1—5. 1982. p. p. quoad K. M. Feng 2474, syn. nov.

矮小、密丛生草本，高 4—10 厘米。叶簇生，叶片线形，长 3—5 厘米，宽 0.8—2 毫米，细弱，被腺柔毛。花萼小，长约 15（—18）毫米；雌雄蕊柄较长。

产云南（中甸、德钦）和四川（木里）。生于海拔 3 700—4 300 米的岩壁。模式标本采自云南西北。

32. 墨脱蝇子草（中国高等植物图鉴补编）图版 79: 1—4


*Silene namlaensis* (Marq.) Bocquet in Candollea **22** (1): 19. 1967 et Phaner. Monogr. **1**: 106. tab. 7. fig. e—f. et tab. 34. fig. c. 1969; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 320. 1982. — *Lychnis namlaensis* Marq. in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**: 164. 1929. — *Melandrium namlaense* (Marq.) Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **2**. Aufl. **16c**: 342. 1934. — *Silene nigrescens* auct., non (Edgew.) Majumdar (1963); 西藏植物志 **1**: 711. 图 28: 1—4. 1983, quoad 西北高原生物所采集队 1553.

多年生草本，高 30—40 厘米，全株密被紫色节腺毛。根较粗壮，木质，褐色。茎丛生或单生，直立，不分枝，下部常显紫色。基生叶花期早枯；茎生叶 2—4 对，叶片狭椭圆形或披针形，长 3—7 厘米，宽 5—12 毫米，基部楔形，顶端急尖，被腺柔毛，中脉明显。花单生或 2—3 朵，微俯垂，后期直立，花梗长 3—5 厘米，密被腺柔毛；苞片披针形；花萼圆柱状钟形，微膨大呈囊状，长约 25 毫米，宽 10—15 毫米，口张开，基部脐形，密被紫色腺毛，纵脉紫黑色，被细硬毛，萼齿宽三角形，长 4—6 毫米，顶端急尖，边缘具缘毛；雌雄蕊柄长约 5 毫米，被疏柔毛；花瓣露出花萼 3—6 毫米，爪近楔形，长约 15 毫米，宽约 6 毫米，具耳，基部近无毛，瓣片微外露，紫色，轮廓近方形，4 裂，裂片圆形或缺刻状，副花冠片近楔形，具不规则细圆齿；雄蕊微露花冠喉部，花丝无毛；花柱内藏。蒴果卵形；种子未见。花期 8—9 月。

产我国西藏（林芝、波密、墨脱、加查、错那、聂拉木）。生于海拔 3 600—4 500 米高山草地。模式标本采自波密。

33. 阿扎蝇子草（新拟）加查女娄菜（西藏植物志）

*Silene atsaensis* (Marq.) Bocquet in Candollea **22** (1): 20. 1967 et Phaner. Monogr. **1**: 112. tab. 5. fig. e—f. et tab. 33. fig. d. 1969. — *Lychnis atsaensis* Marq. in



图版 79 1—4. 墨脱蝇子草 *Silene namlaensis* (Marq.) Bocquet: 1. 植株; 2. 花萼一部分 (放大); 3. 花瓣和雄蕊; 4. 雌蕊。5—9. 准噶尔蝇子草 *S. songarica* (Fisch., Mey. et Avè-Lall.) Bocquet: 5. 植株; 6. 花萼 (剖开); 7. 花瓣和雄蕊; 8. 雌蕊; 9. 种子。(李志民绘)