

产青海(囊谦、玉树、杂多、曲麻、久治)、西藏(昌都)。生于海拔4 200—4 600米的高山草地。模式标本采自青海囊谦。

41. 尼泊尔蝇子草(中国高等植物图鉴补编)

Silene nepalensis Majumdar in Journ. Ind. Bot. Soc. **42**: 649. 1963; Bocquet in Candollea **22**(1): 4. 1967 et Phaner. Monogr. **1**: 19. tab. 17. fig. f—i, et tab. 36. fig. b. 1969; Bocquet et Chatet in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 56. 1979; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 321. 1982. — *Lychnis multicaulis* Wall., Cat. n. 622. 1825, nom. nud.; Wall. ex Benth. in Royle, Illustr. Bot. Himal. **1**: 80. 1839; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 224. 1874. — *Melandrium multicaule* (Wall. ex Benth.) Walp., Rep. Bot. Syst. **1**: 280. 1842; Rohrb. in Linnaea **36**: 226. 1869; 西藏植物志 **1**: 720. 图 228: 10—13. 1983, non *Silene multicaulis* Guss. (1826). — *M. brachypetalum* (Horn.) Fenzl var. *tibetanum* Rohrb. in Linnaea **36**: 231. 1869. — *M. xainzaense* L. H. Zhou in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **1**: 718. fig. 229: 4—6. 1983, syn. nov.

41a. 尼泊尔蝇子草(原变种) 图版 81: 1—8

var. *nepalensis*

多年生草本,高10—50厘米。根粗壮,具多头根颈。茎丛生,直立,不分枝,密被短柔毛。基生叶叶片线状披针形,长3—14厘米,宽3—7毫米,基部渐狭成柄状,多少合生,顶端渐尖,两面和边缘无毛或近无毛,中脉明显;上部茎生叶几无柄,与基生叶同形,基部多少合生,两面和边缘被短柔毛。圆锥花序具数至多数花;花俯垂,后期直立,花梗短,长5—10毫米,密被短柔毛;苞片线形,被短柔毛;花萼钟形,有时球状钟形,微膨大,近草质,长8—10毫米,直径3—4毫米,密被短柔毛,口张开,基部圆形,纵脉暗紫色或暗绿褐色,明显,脉端通常在萼齿连合,萼齿三角形,长约3毫米,顶端钝,边缘膜质,具缘毛;雌雄蕊柄长1—1.5毫米,被短柔毛;花瓣露出花萼2—3毫米,爪宽楔形,长6—8毫米,基部近无毛,具耳,瓣片紫色,轮廓近卵形,长1.5—3毫米,凹缺或2裂,裂片全缘,有时具不明显的齿,副花冠片小,近圆形,顶端钝或缺;雄蕊内藏,花丝无毛;花柱5,有时4,内藏。蒴果卵状椭圆形,长8—10毫米,比宿存萼短或微长,5瓣裂或10齿裂;种子肾形,肥厚,微压扁,长约0.6毫米,灰褐色,两侧具线条纹,脊具小瘤。花期7—8月,果期8月。

产青海、四川、云南、西藏。生于海拔2 700—5 100米山坡草地。锡金、不丹、尼泊尔、巴基斯坦也有。模式标本采自尼泊尔。

本种与准噶尔蝇子草 [*S. songarica* (Fisch., Mey. et Avé-Lall.) Bocquet] 相似,主要区别:花序呈圆锥状;花萼较小,长10毫米以下,通常具暗紫色纵脉;花瓣紫色,深2裂,微外露。