

Sci. Nat. Univ. Intramongol. 16(4): 586. 1985.

花瓣较长，露出花萼 1/3。

产东北、华北、西北（东部）和华东地区。模式标本采自浙江宁波。

56. 台湾蝇子草（台湾植物志） 莫尔蝇子草（拉汉种子植物名称）

Silene morii Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 35. 1913; Kudo, Yushun et Masamune in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. 2: 67. 1932; 台湾植物志 2: 342. pl. 323. 1967. — *S. mushaensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 35. 1913.

二年生草本，高达 70 厘米，全株被短柔毛。主根粗，稍木质。茎单生，直立，不分枝或有时分枝。基生叶叶片倒披针形或披针形，长 4—6 厘米，宽 6—16 毫米，基部渐狭，顶端急尖，两面被短毛，具不明显离基 3 出脉，边缘具缘毛；上部茎生叶渐小，叶片长圆状披针形至披针形。疏圆锥花序；花梗长 3—5 厘米，被短毛；苞片披针形；花萼近卵状钟形，长 7—11 毫米，直径约 3.5 毫米，被柔毛，纵脉顶端连合，萼齿三角状卵形，顶端钝或急尖，边缘膜质，具缘毛；雌雄蕊柄极短；花瓣长 8—12 毫米，宽 2—4 毫米，爪楔形，无缘毛，具圆耳，瓣片轮廓近圆形，浅 2 裂；副花冠片小，近肾形；雄蕊不外露，花丝无毛；花柱不外露，长约 3 毫米。蒴果卵形，长 6—8 毫米，直径约 5 毫米，比宿存萼短；种子圆肾形，具小瘤。花期 5—6 月。

产台湾（台中和台南）。生于山地。

仅据文献记载，未见标本。描述译自《台湾植物志》和《台湾植物图志》。

57. 内蒙古女娄菜（内蒙古大学学报）

Silene orientalmongolica J. Kozhev. , Nov. Syst. Pl. Vasc. 21: 68. fig. 2. 1984. — *Melandrium apricum* (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Rohrb. : 内蒙古植物志 2: 180. 图版 26. 图 3, 6. 1978, p. p. — *M. orientalmongolicum* (J. Kozhev.) Y. Z. Zhao in Act. Sci. Nat. Univ. Intramongol. 16 (4): 586. 1985.

一年生或二年生草本，高 10—40 厘米，全株密被短柔毛。主根较粗壮，木质。茎直立，单生或基部多分枝。叶片倒披针形或披针形，长 2—5 厘米，宽 2—5 毫米，基部渐狭成柄状或无柄，顶端急尖，下面中脉凸起，两面均密被短柔毛；基生叶具柄，茎上部叶无柄。聚伞状圆锥花序顶生；苞片披针形，草质，顶端渐尖，具缘毛；花梗直立，长短不等，长 5—20 毫米，被短柔毛；花萼椭圆形或卵状钟形，长 6—8 毫米，被腺毛，具 10 条纵脉，纵脉绿色，脉端多少连结，果期呈卵形，长达约 10 毫米，萼齿三角状披针形，边缘膜质，具缘毛；雌雄蕊柄极短；花瓣白色或淡红色，比花萼长药 1/3，瓣片倒卵形，顶端浅 2 裂，爪狭楔形；副花冠片舌状；雄蕊不外露，花丝基部被毛；花柱 3，短，基部具短毛。蒴果卵形，长约 8 毫米，比宿存萼短，6 齿裂；种子圆肾形，灰褐色，长约 0.6 毫米，具瘤状凸起。花期 6—7 月，果期 7—8 月。

产内蒙古。生于草原低湿草甸或撂荒地。俄罗斯（西伯利亚）也有。

组 11. 轮伞花组 Sect. *Otites* (Adans.) Otth in DC. Prodr. 1: 367. 1824; Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 237. 1957; Chater et Walters in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 166. 1964. — *Otites* Adans., Fam. Pl. 2: 186. 255. 1763. — *Silene* subgen. *Otites* (Adans.) Peterm. in Deutschl. Fl. 77. 1846, cum auct. epith. Otth — *Silene* § *Otiteae* Boiss., Fl. Orient. 1: 571. 1867. — *Silene* subgen. *Otites* (Adans.) Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 685. 1936. — *Silene* subgen. *Sibiricae* Schischk. ex Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 237. 1957, p. p.

二年生草本。茎单生或丛生，直立，分枝或不分枝。基生叶莲座状，叶片近匙形，茎生叶腋生出不育短枝。花单性，雌雄异株，呈假轮伞状圆锥花序，花序枝对生；花萼钟形，紧贴果实，口张开，具 10 条纵脉；雌雄蕊柄短或无；花瓣白色，全缘，稀凹缺；副花冠缺；花柱 3；种子肾形，表面具短线纹，脊具槽。

我国产 3 种。

分种检索表

- 1. 花萼长 4—6 毫米；花瓣淡绿色 58. 黄雷轮 *S. otites* (L.) Wibel
- 1. 花萼长 2—3.5 毫米，花瓣白色。
 - 2. 花萼被毛；瓣爪和花丝具毛 59. 小花蝇子草 *S. borysthena* (Gruner) Walters
 - 2. 花萼无毛；瓣爪和花丝均无毛
 - 60. 伏尔加蝇子草 *S. wolgensis* (Willd.) Bess. ex Spreng.

58. 黄雷轮 (拉汉种子植物名称)

Silene otites (L.) Wibel, Prim. Fl. Werthem. 241. 1799; Chater et Walters in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 167. 1964. — *Cucubalus otites* L., Sp. Pl. 415. 1753. — *Silene otites* Smith, Comp. Fl. Brit. 2: 469. 1800; Rohrb., Monogr. *Silene* 199. 1868; Williams in Jorun. Linn. Soc. Bot. 32: 155. 1896. — *S. pseudotites* Bess. ex Reichb., Fl. Germ. Excurs. 819. 1832; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 686. 1936.

二年生草本，高 20—40 厘米，全株被微柔毛。根粗壮。茎单生或疏丛生，直立，不分枝。基生叶叶片匙形，长 4—6 厘米，宽 5—12 毫米，基部渐狭成长柄状，顶端圆钝或具凸尖；茎生叶狭小，叶片线状匙形。假轮伞状圆锥花序；花梗纤细，长 4—10 毫米，无毛；花萼钟形，长 4—6 毫米，无毛，萼齿小，顶端钝；雌雄蕊柄几无；花瓣小，淡绿色，线状倒披针形，全缘，爪无毛；副花冠缺；雄蕊微外露。蒴果卵形或近圆形，长 3.5—5 (—6) 毫米，微长于宿存萼；种子肾形，细小。2n=24。花期 6—7 月，果期 8 月。

产新疆北部。广布于欧洲。

本种与小花蝇子草 [*S. borysthena* (Geuner) Walters] 相似，区别在于花瓣淡绿