

3. 花萼筒状钟形，紧贴果实。

9. 瓣片微凹缺或浅2裂，边缘上部啮蚀状 70. 西南蝇子草 *S. delavayi* Franch.

9. 瓣片深4裂，裂片全缘或2裂，但不啮蚀状。

10. 瓣爪耳明显、圆形，边缘啮蚀状；瓣片裂片不等大。

11. 花瓣明显露出花萼，长20—25毫米 71. 长角蝇子草 *S. longicornuta* C. Y. Wu et C. L. Tang

11. 花瓣不露或微露出花萼，长约10毫米 72. 倒披针叶蝇子草 *S. oblanceolata* W. W. Smith

10. 瓣爪耳不明显；瓣片裂片近等大 73. 线瓣蝇子草 *S. lineariloba* C. Y. Wu

62. 垫状蝇子草（新拟） 簇生女娄菜（拉汉种子植物名称） 图版88：1—6

Silene kantzeensis C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 2: 439. 1980; 中国高等植物图鉴补编1: 323. 1982, in clavi. — *S. caespitosa* Bur. et Franch. in Journ. de Bot. 5: 22. 1891, non Stev. (1812). — *Melandrium caespitosum* Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 34: 431. 1899; Breslau et Limpr. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 362. 1922; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 343. 1934; 西藏植物志 1: 728. 1983.


多年生垫状草本，高4—8厘米。根圆柱形，稍粗壮，多分枝，褐色，具多头根颈。茎密丛生，极短，不分枝。基生叶叶片倒披针状线形，长10—25毫米，宽2—3毫米，基部渐狭，顶端渐尖或急尖，两面无毛，边缘具粗短缘毛；茎生叶1—2对或无，与基生叶同形。花单生，直立，直径15—20毫米；花梗比叶短，密被短柔毛；花萼狭钟形或筒状钟形，长13—18毫米，直径3—5毫米，基部截形，暗紫色，被紫色腺毛，纵脉紫色，萼齿三角状卵形，顶端钝，边缘膜质，具缘毛；雌雄蕊柄无毛，长约1毫米；花瓣淡紫色或淡红色，长约20毫米，爪狭楔形，无毛，耳卵形，瓣片露出花萼，轮廓倒卵形，叉状深2裂达瓣片中部，裂片狭长圆形，全缘，有时瓣片两侧下部各具1不明显的齿；副花冠片倒卵形，全缘或具缺刻；雄蕊内藏，花丝无毛；花柱不外露。蒴果圆柱形或圆锥形，长约15毫米，粗约3.5毫米，微长于宿存萼；种子圆肾形，长约1毫米，微扁，近平滑，脊锐，暗褐色。花期7—8月，果期9—10月。

产青海（东南）、四川（西部）、云南（西北）、西藏。生于海拔（3500—）4100—4700米的高山草甸。模式标本采自四川康定。

本种原始描述“花瓣2裂”。但据标本观察除2裂外，有时瓣片两侧各具一细齿。

63. 纤细蝇子草（云南植物志）

Silene gracilentia H. Chuang in Fl. Yunnan. 6: 217. Addenda 836. 1995. — *S. graminoides* C. Y. Wu et C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 4: 164. 1982, p. p., f. et K. M. Feng 2474 exclud, quoad T. T. Yü 13802, tantum., sym. nov.



图版 88 1—6. 垫状蝇子草 *Silene kantzeensis* C. L. Tang; 1. 植株; 2. 花解剖; 3. 花瓣;
4. 带萼的果实; 5. 果实; 6. 种子。7—11. 西南蝇子草 *S. delavayi* Franch.; 7. 植株一部分;
8. 花萼剖开 (示萼齿); 9. 花瓣; 10. 雌蕊; 11. 果实。(李志民绘)