

5 厘米, 宽 5—15 (—20) 毫米, 基部宽楔形或渐狭成柄状, 顶端长渐尖, 两面被稀疏短柔毛, 边缘具短缘毛, 具 1 或 3 条基出脉。二歧聚伞花序疏松, 大型; 花梗细, 长 8—30 (—50) 毫米, 被短柔毛; 苞片披针形, 草质; 花萼筒状棒形, 长 12—15 毫米, 直径 3—5 毫米, 纵脉绿色, 稀紫色, 无毛或沿脉被稀疏短柔毛, 萼齿三角形, 顶端急尖或渐尖, 稀钝头, 边缘膜质, 具短缘毛; 雌雄蕊柄无毛, 长约 4 毫米; 花瓣白色, 轮廓倒披针形, 爪不露或微露出花萼, 无毛, 无耳, 瓣片倒卵形, 长约 7 毫米, 浅 2 裂达瓣片的 1/4, 两侧中部具 1 线形小裂片或细齿; 副花冠片椭圆状, 全缘; 雄蕊明显外露, 花丝无毛; 花柱明显外露。蒴果卵形或狭卵形, 长 6—8 毫米, 比宿存萼短; 种子肾形, 长约 1 毫米, 红褐色至灰褐色, 脊圆钝。花期 7—8 月, 果期 8—10 月。

产河北、内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、四川(东部)和贵州。生于海拔 800—2 900 米灌丛中、疏林下多石质的山坡或岩石缝中。模式标本采自北京房山。

78. 卡里蝇子草 (云南植物研究) 红花女娄菜 (拉汉种子植物名称)

*Silene kermesina* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 11: 224. 1919; C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 9: 25. 1987. — *Melandrium kermesinum* (W. W. Smith) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 205. 1929; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 343. 1934.

多年生草本, 全株被短柔毛。根圆柱形。茎疏丛生, 上升或俯仰, 长达 60 厘米, 多分枝。叶片卵状披针形, 长 3—6 厘米, 宽 10—25 毫米, 基部圆形, 无柄或下延成短柄状, 顶端长渐尖, 两面被疏柔毛或近无毛, 边缘具粗缘毛, 具 3 基出脉。二歧聚伞花序大型, 疏松, 常具数花; 苞片线状披针形, 草质, 长 5—15 毫米, 被腺柔毛; 花梗长 1—6 厘米, 密被腺柔毛; 花萼筒状棒形, 长约 13 (—15) 毫米, 直径约 5 毫米, 密被腺柔毛, 有时稀疏, 纵脉紫色或暗绿色, 萼齿三角形, 长约 3 毫米, 顶端圆钝, 边缘膜质, 具短缘毛; 雌雄蕊柄无毛, 长 3—5 毫米; 花瓣白色或黄白色, 露出花萼 5—6 毫米, 爪不外露, 上部宽, 微啮蚀状, 瓣片轮廓倒卵形, 深 2 裂几达瓣片的中部, 裂片长圆形, 瓣片两侧各具 1 线形小裂片或细齿; 副花冠片近方形, 全缘; 雌蕊微外露, 花丝无毛; 花柱外露。蒴果卵状长圆形, 长 8—10 毫米, 比宿存萼短; 种子肾形, 肥厚, 长 1—1.2 毫米, 灰褐色, 脊圆钝。花期 8 月, 果期 9 月。

产云南(西北)、四川(西部)。生于海拔 2 700—3 250 米的山地灌丛中或草坡。模式标本采自云南维西至叶枝间。

本种与石生蝇子草 (*Silene tatarinowii* Regel) 相似, 区别在于: 花萼较粗, 密被腺柔毛; 瓣片深 2 裂等。

本种的原始记载“花胭脂红色 (*kermesina*)”。并用该词作种加词。根据对 G. Forrest 12931 (isotypus) 和云南产大量标本的观察, 花实系白色或黄白色。显然, 原记载有错

误。正因花颜色记载之误，后来的某些作者常将掌脉蝇子草 (*Silene asclepiadea* Franch.) 误定为本种。两者较易区别，掌脉蝇子草的花萼卵状钟形，长 8—12 毫米；花瓣紫红色。

79. 汉城蝇子草 (云南植物研究)

*Silene seoulensis* Nakai in Journ. Coll. Sci. Tokyo **26** (1): 77. tab. 7. 1909 et Fl. Kor. **1**: 17. tab. 7. 1909. — *Melandrium seoulense* (Nakai) Nakai in Mori, Enum. Pl. Cor. 145. 1922 et in Journ. Jap. Bot. **13**: 872. 1937.

79a. 汉城蝇子草 (原变种)

var. *seoulensis*

多年生草本，全株被短柔毛。茎丛生，纤细，上升，长 40—60 厘米，稀疏分枝，基部节常生不定根。叶片卵形或卵状披针形，长 3—6 厘米，宽 2—3 厘米，基部圆形，近无柄或急狭成短柄状，顶端急尖，两面和边缘均被柔毛，具 1 或 3 基出脉。二歧聚伞花序疏松；花梗长，纤细，被柔毛；苞片披针形；花萼钟形，长约 5 毫米，无毛，果期口半开，纵脉暗绿色，萼齿三角状卵形，长约 1 毫米，顶端钝；雌雄蕊柄几无或长 1 毫米，无毛；花瓣白色或淡黄白色，爪倒披针形，不露出花萼，无毛，无耳，瓣片外露，轮廓三角状卵形，2 裂几达瓣片的中部；副花冠片乳头状；雄蕊微外露，花丝无毛；花柱外露，顶端被柔毛。蒴果卵形，长约 5 毫米，比宿存萼短或微长；种子肾形，脊圆钝。花期 7—8 月，果期 9—10 月。

我国东北 (沿鸭绿江畔) 可能产。模式标本采自朝鲜。描述系根据文献和副模式标本写成。

79b. 狭叶汉城蝇子草 (变种) (植物分类学报)

var. *angustata* C. L. Tang in Act. Phytotax. Sin. **24**(5): 391. 1986.

叶片狭披针形，长 3—4 厘米，宽 5—10 毫米。花萼密被短柔毛。

产辽宁 (东南)。模式标本采自辽宁凤城。

80. 齐云山蝇子草 (云南植物研究)

*Silene qiyunshanensis* X. H. Guo et X. L. Liu in Act. Bot. Yunnan. **13**(1): 24. tab. 1. 1991.

多年生草本，全株被短柔毛。根粗壮，圆柱形，肉质。茎丛生，铺散，细弱，下部多分枝。基生叶具长柄，柄长可达 4 厘米，茎生叶向上叶柄渐短；叶片宽卵形或近圆形，长 (0.5—) 1.5—2 (—3.5) 厘米，宽 (0.5—) 1—2 (—2.5) 厘米，顶端急尖成凸尖头，基部宽楔形至近截形，急狭成短柄状，两面被柔毛，后渐脱落，边缘具缘毛。二歧聚伞花序疏松，大型，花序轴、花梗和花萼均密被柔毛；苞片卵形，小，草质；花梗长 0.7—2 厘米；花萼钟形，长 4—5 毫米，具 10 条纵脉，萼齿卵形，长 1.5—2 毫米，外面密被柔毛；花瓣白色或粉红色(?)，轮廓倒披针形，长 7—9 毫米，爪微露出花萼，瓣片叉状 4 (—6) 裂，裂片条形；副花冠片小，鳞片状；雌雄蕊柄长 0.5—1 毫米；雄蕊 10，