

不外露，花丝基部扩大，无毛；花柱3。蒴果卵形，长约2.5毫米，比宿存萼短；种子圆肾形，直径约0.7毫米，紫褐色，表面具环形小瘤状凸起。花期6—7月，果期8—9月。

产安徽（休宁县）。生于海拔400米林缘多砾石的坡地。

81. **大花蝇子草**（拉汉种子植物名称）**金蝴蝶**（植物名实图考），**大花女娄菜**（中国高等植物图鉴）

*Silene grandiflora* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 427. 1886 et Pl. Delav. 90. tab. 23. 1889; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 126. 1896; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 302. 1912; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 203. 1929; 中国高等植物图鉴补编1: 325. 1982. — *Melandrium grandiflorum* (Franch.) Y. W. Tsui in Icon. Cormoph. Sin. 1: 639. fig. 1277. 1972.

多年生草本。茎俯仰，长40—50厘米，分枝，被短柔毛。叶片披针形或狭披针形，长3—6厘米，宽4—15毫米，基部近圆形或宽楔形，顶端渐尖，两面微粗糙，沿脉被疏毛，边缘具缘毛，中脉明显，稀具3基出脉。二歧聚伞花序疏松；花直立，直径达25毫米；花梗细，长4—7厘米，被短柔毛；苞片披针形，草质，被柔毛；花萼筒状棒形，长约20毫米，直径约4毫米，基部脐状，淡绿色或带红色，被稀疏短柔毛，纵脉不明显，萼齿卵状披针形，长约2.5毫米，顶端钝，边缘膜质；雌雄蕊柄长5—8毫米；花瓣红色，长20—25毫米，爪狭倒披针形，无毛，具耳，瓣片倒心形，浅2裂，裂片半圆形；副花冠片长圆形；雄蕊外露，花丝无毛；花柱微外露。蒴果卵状长圆形，比宿存萼短；种子肾形。花期7—8月。

产云南（鹤庆、永胜）。生于海拔2000米左右的灌丛草地。模式标本采自鹤庆。

82. **宽叶蝇子草**（中国高等植物图鉴补编）**阔叶女娄菜**（拉汉种子植物名称）

*Silene platyphylla* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 419. 1886 et Pl. Delav. 81. 1889; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 302. 1912; C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 9: 26. 1987. — *S. platyphylla* Franch. f. *paniculifera* Franch. l. c. 33: 419. 1886. — *S. platyphylla* Franch. f. *involucrata* Franch. l. c. 33: 419. 1886. — *S. platyphylla* Franch. f. *congesta* Franch. l. c. 33: 419. 1886. — *Melandrium platyphyllum* (Franch.) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 204. 1929.

82a. **宽叶蝇子草**（原变种）

var. **platyphylla**

多年生草本。根圆柱形。茎俯仰，长60—100厘米，多分枝，被短柔毛。叶片卵形，长6—8厘米，宽3—5厘米，基部圆形或浅心形，顶端急尖，下面被粗毛，边缘具缘毛，具3或5基出脉。二歧聚伞花序稀疏，稀呈团伞花序；花直立，直径约20毫米；花梗长10—30毫米，密被粗毛；苞片卵形，草质，被密柔毛；花萼筒状棒形，长约15毫米，沿纵脉密被刺状毛，萼齿三角状披针形，顶端急尖或渐尖，边缘膜质，具缘毛；雌雄蕊柄