

in Act. Bot. Yunnan. 9: 27. 1987. — *S. kumaensis* auct., non Williams (1896): 西藏植物志 1: 736. 1983.

多年生草本。茎俯仰，长 25—40 厘米，多分枝，密被短腺毛，有时仅上部被腺毛。叶片卵状披针形至披针形，长 1.5—2.5 厘米，宽 5—10 (—12) 毫米，基部圆形，顶端渐尖，两面密被短柔毛，边缘具腺毛，具 1 或 3 条基出脉。二歧聚伞花序稀疏，常具数花；花梗细，长 1—2.5 厘米，被腺柔毛；苞片披针形，长 8—10 毫米，被短柔毛；花直立，直径约 11 毫米；花萼筒状棒形，长约 (10—) 15 毫米，直径约 3 毫米，基部截形，外面密被短腺毛，纵脉深绿色，萼齿狭披针形，长约 5 毫米，顶端渐尖，被短腺毛，边缘具短缘毛；雌雄蕊柄长约 3 毫米，无毛；花瓣白色或淡红色，爪楔状倒披针形，长约 10 毫米，无毛，耳三角状，全缘或微啮蚀状，瓣片轮廓长圆形，长约 5 毫米，浅 2 裂达瓣片的 1/3，裂片顶端斜形，全缘或具缺刻；副花冠片近方形，长约 1.5 毫米，具缺刻或钝齿；雄蕊和花柱微外露。蒴果卵形，长约 8 毫米；种子未见。花期 7—8 月。

产我国西藏（林芝、拉萨、乃东、米林）。生于海拔 3 200—4 300 米高山灌丛草地或山麓砾石滩。模式标本采自江孜。

本种与拉萨蝇子草 [*S. lhassana* (Williams) Majumdar] 相似，区别在于：全株密被腺柔毛；花萼筒状棒形，长约 15 毫米，密被短腺毛，脉不明显；萼齿狭披针形，长约 5 毫米，顶端渐尖等。

85. 糙叶蝇子草 (拉汉种子植物名称)

Silene trachyphylla Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 418. 1886 et Pl. Delav. 79. 1889; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 302. 1912. — *S. yunnanensis* auct., non Franch. (1886): 西藏植物志 1: 741. 1983, p. p. quoad 青藏队 86—12825.

多年生草本。根簇生，圆柱形，具粗壮根颈。茎俯仰或上升，分枝，密被腺柔毛。叶片狭披针形或披针形，长 3—5 厘米，宽 6—8 (—12) 毫米，基部渐狭，顶端渐尖，两面被粗毛，边缘具粗缘毛，中脉明显。二歧聚伞花序大型，具多数花；花梗比花萼长或近等长，密被腺毛；苞片披针形；花萼筒状棒形，长 15—20 毫米，直径约 3.5 毫米，基部脐形，密被柔毛和稀疏腺毛，纵脉紫色，萼齿三角状卵形，长约 2 毫米，被柔毛，顶端钝，边缘膜质，具缘毛；雌雄蕊柄无毛，长约 3 毫米；花瓣淡红色，长约 25 毫米，爪微露出花萼，倒披针形，无毛，耳不明显，瓣片轮廓倒卵形，长约 7 毫米，浅 2 裂，裂片卵形，瓣片两侧具 1 小齿状裂片；副花冠片卵形，有时具缺刻；雄蕊微外露，花丝无毛；花柱微外露。蒴果卵状长圆形，长 10—12 毫米；种子肾形。花期 7—8 月，果期 8—10 月。

产青海、四川、云南和西藏。生于海拔 3 100—3 900 米的灌丛中。模式标本采自云南鹤庆。

86. 掌脉蝇子草 (云南植物研究) 马利筋女娄菜 (拉汉种子植物名称)

Silene asclepiadea Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 422. 1886 et Pl. Delav.

84. 1889; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **7**: 302. 1912; C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. **9**: 27. 1987. — *S. asclepiadea* Franch. var. *glutinosa* Franch. l. c. **33**: 422. 1886. — *S. lutea* Franch. l. c. **33**: 422. 1886. — *S. adenantha* Franch., Pl. Delav. 84. 1889. — *S. szechuanensis* Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. **34**: 428. 1898. — *Lychnis adenantha* (Franch.) Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **7**: 302. 1912. — *S. platyphylla* auct., non (Franch.) f.; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **7**: 225. 1912. — *Melandrium adenanthum* (Franch.) Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 204. 1929. — *M. viscidulum* (Franch.) Williams var. *szechuanense* (Williams) Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 205. 1929. — *M. asclepiadeum* (Franch.) Hand.-Mazz. ex Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. **16c**: 343. 1934.

86a. 掌脉蝇子草 (原变种) 图版 92: 8—14

var. *asclepiadea*

多年生草本, 全株被短柔毛。根簇生, 圆柱形, 稍肉质。茎铺散, 俯仰, 长达 100 厘米, 多分枝, 上部多少被腺毛。叶片宽卵形或卵状披针形, 长 4—7 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米, 基部圆形或近浅心形, 顶端渐尖, 上面无毛或被疏柔毛, 下面沿脉被疏柔毛, 具 3 或 5 条基出脉。二歧聚伞花序大型; 花直立; 花梗与花萼近等长, 密被腺毛; 苞片卵状披针形, 草质, 被短柔毛; 花萼钟形, 长 8—12 毫米, 直径约 4 毫米, 基部圆形, 花后微膨大, 纵脉紫色, 脉端连合, 沿脉密被腺毛, 萼齿三角状卵形, 顶端急尖; 雌雄蕊柄短, 长 1—2 毫米; 花瓣淡紫色或变白色, 长约 15 毫米, 爪楔形, 无毛, 上部啮蚀状, 瓣片 4 裂, 中裂片狭长圆形, 侧裂片小, 线形; 副花冠片近方形, 具齿或全缘; 雄蕊外露, 花丝无毛。蒴果卵形, 长约 10 毫米, 比宿存萼短; 种子肾形, 两侧耳状凹, 脊平。花期 7—8 月, 果期 8—10 月。

产云南、四川和贵州。生于海拔 1 300—3 900 米的灌丛草地或林缘。模式标本采自云南大理。

本种 (原变种) 与宽叶蝇子草 (原变种) (*S. platyphylla* Franch. var. *platyphylla*) 相似, 主要区别: 花萼钟形, 被腺毛; 花瓣 4 裂, 裂片几等大。

86b. 丛林蝇子草 (变种) (拉汉种子植物名称)

var. *dumicola* (W. W. Smith) C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. **9**: 28. 1987. — *Silene dumicola* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **11**: 222. 1919.

叶近圆形。

产四川 (西南)、云南 (西北)。生于海拔 2 900—3 200 米灌丛草地。模式标本采自云南丽江。

87. 卡西亚蝇子草 (云南植物研究)

Silene khasiana Rohrb. in Linnaea **36**: 258. 1869; Edgew. et Hook. f. in Hook.