

89. 头序蝇子草 (中国高等植物图鉴补编) 馒头草 (拉汉种子植物名称), 馒头麦瓶草 (东北植物检索表), 头序麦瓶草 (东北草本植物志)

*Silene capitata* Kom. in Act. Hort. Petrop. 18(6): 440. 1901 et l. c. 22 (Fl. Mansh. 2): 199. tab. 4a. 1903; Nakai, Fl. Kor. 1: 77. tab. 6. fig. 2. 1909; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 202. 1939; 东北草本植物志 3: 67. 1975; C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 9: 29. 1987. — *Melandrium capitatum* Kom. ex Mori, Enum. Pl. Cor. 145. 1922, nom. nud.

多年生草本。茎铺散，俯仰，长20—40厘米，上部分枝，密被卷柔毛。叶片宽卵形或心状卵形，长约2厘米，宽10—15毫米，基部圆形或浅心形，具短柄或无柄，顶端急尖，具短尖，两面被卷柔毛，具1或3基出脉。头状花序直径约15(—20)毫米，顶生或腋生，常具3—40花；总苞片4枚，草质，其中2片卵形，较大，2片披针形，较小；花梗长2—4毫米，被短柔毛；花萼钟形，长约8毫米，密被柔毛和稀疏腺毛，花后微膨大，萼齿三角状披针形，长2—3毫米，顶端钝；雌雄蕊柄长约1毫米；花瓣淡红色或带紫色，长10—12毫米，爪倒披针形，无毛，耳不明显，瓣片轮廓倒卵形，深2裂达瓣片的中部或更深，裂片狭长圆形，全缘；副花冠片乳头状；雄蕊明显外露，花丝无毛；花柱明显外露，长约10毫米。蒴果卵形，长约5毫米，比宿存萼短；种子肾形。花期6—7月，果期8月。

我国东北(鸭绿江畔)可能有。上述描述译自文献。模式标本采自朝鲜。

90. 心瓣蝇子草 (中国高等植物图鉴补编) 图版 96: 1—4

*Silene cardiopetala* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 419. 1886 et Pl. Delav. 80. tab. 21. 1889; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 302. 1912; 中国高等植物图鉴补编 1: 324. 1982, in clavi; C. L. Tang in Act. Bot. Yunnan. 9: 24. 1987. — *Melandrium cardiopetalum* (Franch.) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 204. 1929; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 343. 1934.

多年生草本。根簇生，圆柱形或纺锤形。茎铺散，俯仰，纤细，长40—100厘米，分枝，被短柔毛。叶片椭圆形，长2—3(—4)厘米，宽7—15(—17)毫米，基部渐狭，顶端急尖，两面近无毛，下面沿中脉被疏柔毛，边缘具缘毛，中脉明显。二歧聚伞花序，花直径约20毫米；花梗比花萼长，稀较短，密被柔毛；苞片线状披针形，被疏毛；花萼筒状棒形，长15—18毫米，直径约3毫米，后期微膨大，纵脉不明显，沿脉被稀疏柔毛或无毛，萼齿卵状披针形，顶端钝，边缘膜质；雌雄蕊柄长约4.5毫米，无毛；花瓣淡红色，长20—25毫米，爪楔形，无毛，具耳，瓣片倒心形，宽6—7毫米，微凹缺或浅2裂，裂片宽卵形，全缘；副花冠片圆形，全缘；雄蕊微外露，花丝无毛，花药暗紫色；花柱微外露。蒴果卵状长圆形，长约10毫米，比宿存萼短；种子肾形，脊微凸。花期7—9月，果期8—10月。