

in Act. Bot. Yunnan. 4: 155. fig. 7. 1982, p. p. quoad. typ. tantum.

多年生草本。茎疏丛生，铺散，上升，多分枝，长40—60厘米，被短柔毛，上部被腺毛。叶片椭圆形，有时近倒卵形，长2—4厘米，宽10—20毫米，基部楔形，顶端圆形或圆钝，具凸尖，上面被乳凸或疏毛，下面被柔毛，边缘具粗缘毛；上部茎生叶较小。二歧聚伞花序具7—15花，花序轴密被腺毛；花梗长2—4厘米，被腺毛；苞片披针形或线形；花萼钟形，长11—13毫米，直径约3.5毫米，基部脐形，纵脉紫色，密被腺柔毛，萼齿近圆形或钝三角形，长约1.5毫米，被疏柔毛；雌雄蕊柄长约2毫米，无毛；花瓣淡红色，长约2厘米，爪露出花萼约5毫米，倒披针形，无毛，耳不明显，瓣片轮廓近圆形，长约5毫米，浅4裂，中裂片四方形或椭圆形，全缘，侧裂片齿状；副花冠片小，长椭圆形，全缘；雄蕊内藏，仅达花萼中部，花丝无毛；花柱明显外露。蒴果卵状长椭圆形，长约8毫米；种子未见。花期9月，果期10月。

产四川、云南。生于海拔2 800—3 000米的林缘草地。模式标本采自云南德钦。

本种与心瓣蝇子草(*S. cardiopetala* Franch.)相似，区别在于：花直径小，约15毫米；花萼钟形，长约12毫米；花瓣爪外露约5毫米，瓣片轮廓近圆形，浅4裂等。

95. 红齿蝇子草(拉汉种子植物名称) 图版94: 5—9


*Silene phoenicodonta* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 422. 1886 et Pl. Delav. 84. 1889, sphalmate ut *phaenicodonta*; Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 252. 1957, sphalmate ut *phienicodonta*.

多年生草本。根簇生，圆柱形，黑褐色。茎疏丛生，上升，分枝，长25—50厘米，下部被疏柔毛，上部被稀疏腺毛。下部茎生叶叶片卵状椭圆形或倒卵状椭圆形，长5—10(—12)厘米，宽2—3厘米，基部渐狭呈柄状，顶端急尖，淡绿色，两面近无毛或沿脉被疏柔毛，边缘具短柔毛，具3基出脉；上部茎生叶叶片常卵形，较小，无柄。二歧聚伞花序疏松，具数花；花直立；花梗和花序梗被柔毛和稀疏腺毛；苞片卵状披针形，被柔毛；花萼卵状钟形，长6—8毫米，基部圆形，纵脉绿色或带紫色，沿脉疏生粗毛和腺毛，花后微膨大，萼齿卵形，顶端急尖，带紫色；雌雄蕊柄无毛，长约1毫米；花瓣暗紫色，长10—12毫米，爪不露出花萼，近匙形，无毛，上部扇形扩大，具缺刻，瓣片轮廓倒卵形，深2裂达瓣片的中部，裂片卵形或近条形；副花冠小，长圆状线形；雄蕊不外露或微外露，花丝无毛；花柱外露。蒴果宽卵形，长7—10毫米，比宿存萼短；种子肾形，肥厚，暗褐色，长约1毫米，脊宽而钝。花期6—7月，果期7—8月。

产四川(南部和东部)、云南(西北)。生于海拔1 600—2 600米的灌丛中或溪边。模式标本采自云南鹤庆(大坪子)。

本种与粘萼蝇子草(*S. viscidula* Franch.)相似，区别在于：花萼仅沿脉被疏毛；花瓣短，爪不露出花萼，耳扇形，边缘啮蚀状等。

96. 耳齿蝇子草(新拟) 图版99: 1—5



图版 94 1—4. 云南蝇子草 *Silene yunnanensis* Franch. : 1. 植株; 2. 花萼; 3. 花瓣; 4. 雌蕊。5—9. 红齿蝇子草 *S. phoenicodonta* Franch. : 5. 花枝; 6. 花萼; 7. 萼齿; 8. 花瓣; 9. 雌蕊。(钱存源绘)