

580. 1842. — *Melandrium* sect. *Elisanthe* A. Br. in Flora **26**: 371. 1843. — *M.* sect. *Eumelandrium* A. Br. in Flora **26**: 371. 1843. — *Silene* § *Melandriiformes* Boiss., Fl. Orient. **1**: 568. 1867. — *Melandrium* subgen. *Eumelandrium* (A. Br.) Schischk. in Kom. Fl. USSR **6**: 704. 1936. — *M.* subgen. *Elisanthe* (Fenzl) Schischk. ser. *Noctiflorae* Schischk. in Kom. Fl. USSR **6**: 172. 1936, descr. ross. — *Silene* sect. *Melandriiformes* (Boiss.) Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. **22**: 244. 1957, sine auct. comb.

一、二年生草本，稀多年生。茎直立，分枝。花单性，雌雄异株，稀两性，呈二歧聚伞花序；花萼筒状或卵形，被腺毛，紧贴果实，口微闭合，具10条纵脉〔仅 *S. alba* (Mill.) E. Krause 的雌花萼具20条脉〕，萼齿披针形；雌雄蕊柄短；花瓣白色或淡红色，明显露出花萼，瓣片2裂，爪具耳；有副花冠；花柱5，稀3；种子肾形，具小瘤，脊宽平。

我国产2种1亚种。

分种检索表

1. 花单性，雌雄异株，雌花花柱5 108. 白花蝇子草 *S. pratensis* (Rafin.) Godron et Gren.
1. 花两性，花柱3 109. 夜花蝇子草 *S. noctiflora* L.

108. 白花蝇子草 异株女娄菜 (东北植物检索表)

Silene pratensis (Rafin.) Godron et Gren. in Gren. et Godron, Fl. France **1**: 216. 1847; McNeill et C. Prentice in Taxon **30** (1): 29. 1984. — *Lychnis pratensis* Rafin., Dann. Holst. Fl. **2**: 792. 1800. — *Lychnis alba* Mill., Gard. Dict. ed. 8, n. 4. 1768, non *Silene alba* Muhl. ex Britton Mem. Torrey Bot. Club. **5**: 148. 1893. — *Melandrium album* (Mill.) Garcke, Fl. Deutschl. Fl. 4. Aufl. 55. 1858; Schischk. in Kom. Fl. USSR **6**: 725. 1936; 东北草本植物志 **3**: 62. 1975. — *Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause in Sturn, Deutschl. Fl. 2. Aufl. **5**: 98. 1901; Chater et Walters in Tutin et al. Fl. Europ. **1**: 174. 1964, non *S. alba* Muhl. ex Britton (1893).

108a. 白花蝇子草 (原亚种)

subsp. *pratensis*

一、二年生草本，稀多年生，高40—80厘米。茎直立，分枝，下部被柔毛，上部被腺柔毛。下部茎生叶叶片椭圆形，基部渐狭成柄状，上部茎生叶叶片长圆状披针形或披针形，无柄，长6—8厘米，宽1—2.7厘米，顶端渐尖，两面和边缘密被短柔毛，具3基出脉。花单性，雌雄异株，成二歧聚伞花序；花梗短，通常长不超过10毫米，被腺柔毛；苞片卵状披针形，被柔毛；花萼被短柔毛和腺毛，萼齿三角形，顶端渐尖，边缘具腺柔毛；雄花萼筒状钟形，长13—15毫米，具10条纵脉；雌花萼筒状卵形，果期中部膨大，上部收缩，长15—20毫米，具20条纵脉；雌雄蕊柄极短；花瓣白色，爪露出花萼，楔