

罗斯（西西伯利亚）以及欧洲也有。模式标本采自欧洲。

组 20. 折梗组 Sect. Erectorefractae Chowdhuri in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 247. 1957; Chates et Walter in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 177. 1964.

一年生草本。茎上升，分枝，稀不分枝，被腺毛。花两性，直立或开展，具长梗，成单歧式聚伞花序；花萼卵形，与果实间松弛，口收缩，具10条纵脉；雌雄蕊柄短；花瓣淡红色，稀白色，2裂；有副花冠；花柱3；种子圆肾形，表面具小瘤，脊具槽。

我国栽培1种。

110. 大蔓樱草（华北经济植物志要） 矮雪轮（拉汉种子植物名称），小町草（中国种子植物分类学） 图版103: 8—13

*Silene pendula* L., Sp. Pl. 418. 1753; Boiss., Fl. Orient. 1: 590. 1867; Rohrb., Monogr. Silene 111. 1868; Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 69. 1896; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 614. 1936; 中国高等植物图鉴补编 1: 325. 1982, in clavi.

一年生或二年生草本，全株被柔毛和腺毛。茎俯仰，多分枝，长20—40厘米。叶片卵状披针形或椭圆状倒披针形，长3—5厘米，宽5—15（—20）毫米，基部渐狭，顶端急尖或钝头，两面被伏柔毛。单歧式聚伞花序；花梗细，直立，长5—15毫米，果时反折；苞片披针形，草质；花萼倒卵形，长13—15毫米，直径约5毫米，被短柔毛，纵脉微凸起，带紫色，沿脉被腺柔毛，脉间宽，膜质，萼齿短，三角形，顶端钝，边缘膜质；雌雄蕊柄无毛，长3—5毫米；花瓣淡红色至白色，爪狭楔形，无毛，瓣片轮廓倒心形，长7—10毫米；副花冠片长圆形，顶端钝；雄蕊微外露；花柱明显外露。蒴果卵状锥形，长约9毫米，比宿存萼短；种子圆肾形，长约1毫米。花期5—6月，果期6—7月。

我国城市庭园有栽培。原产欧洲南部。


组 21. 蝇子草组 Sect. Silene — *Silene* subgen. *Eusilene* (Rohrb.) Williams in Journ. Linn. Soc. Bot. 32: 26. 1896. — *Silene* subgen. *Silene* § 2. *Eusilene* Rohrb., Monogr. Silene 67. 1868. — *Silene* sect. *Stachymorpha* Otth in DC. Prodr. 1: 371. 1824, p. p. — *Silene* sect. *Cincinosilene* Rohrb., Monogr. Silene 67. 93. 1868; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 602. 1936, p. p.

一年生草本。茎直立，分枝或不分枝。花两性，近无梗，成单歧聚伞花序；花萼卵形，紧贴果实。口收缩，具10条纵脉；雌雄蕊柄短或近无；花瓣淡红色，稀白色；有副花冠；花柱3。蒴果卵形；种子肾形，微侧扁，表面具短线条纹，脊宽平或具槽。

我国栽培1种。

111. 蝇子草（新拟） 白花蝇子草（拉汉种子植物名称），西欧蝇子草（中国高等植物图鉴补编）

*Silene gallica* L., Sp. Pl. 417. 1753; Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ. 3 (2): 283.



图版 103 1—7. 夜花蝇子草 *Silene noctiflora* L. : 1. 茎中部; 2. 花枝; 3. 萼齿 (放大); 4. 花瓣; 5. 副花冠; 6. 雌蕊; 7. 种子。8—13. 大蔓樱草 *S. pendula* L. : 8. 花枝; 9. 花萼; 10. 萼齿; 11. 花瓣; 12. 雌蕊; 13. 种子。(钱存源绘)