

我国产1种。

17. 缕丝花 (拉汉种子植物名称) 丝石竹 (华北经济植物志要)

Gypsophila elegans M. Bieb., Fl. Tauc.-Cauc. 1: 319. 1808; Ser. in DC. Prodr. 1: 353. 1824; Fiori, Icon. Fl. Ital. 149. fig. 1207. 1921; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 764. 1936; Bailey, Man. Cult. Pl. 381. 1949; Barkoudah in Wentia 9: 134. pl. 14. fig. 1—6. 1962; Barkoudah et Chater in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 184. 1964; 中国高等植物图鉴补编 1: 337. 图 8578. 1982.

一年生草本, 高 30—45 厘米。茎直立, 分枝, 被白粉。叶片线状披针形, 中部叶较大, 长 2—4 厘米, 宽 2—5 毫米, 顶端急尖或钝, 基部渐狭, 两面无毛。圆锥状聚伞花序疏展; 花直径约 12 毫米; 花梗细, 长 1—3 厘米; 苞片三角形, 边缘膜质; 花萼钟形, 长 3—4 毫米, 萼齿裂至中部, 卵形, 顶端圆, 边缘膜质; 花瓣白色或粉红色, 长圆形, 长为花萼的 2—3 倍, 顶端截形或微凹, 基部急狭; 雄蕊比花瓣短; 子房卵球形, 花柱短。蒴果卵球形, 长于宿存萼; 种子直径 1.2 毫米, 具钝瘤。花期 5—6 月, 果期 7 月。

我国常栽培供观赏。欧洲至高加索、土耳其东部、伊朗也有。模式标本采自高加索。

组 5. 长胚根组 Sect. *Macrorrhizaea* Boiss., Fl. Orient. 1: 536. 1867.

一年生草本。茎毛发状。叶片宽少于 3 毫米。花萼倒圆锥筒状或长圆形。蒴果长圆形; 种子多而小, 具显著伸长的胚根。

我国产 1 种。

18. 细小石头花 (植物研究)

Gypsophila muralis L., Sp. Pl. 408. 1753; Ser. in DC. Prodr. 1: 354. 1824; Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. 1: 288. 1842; Hegi, Illustr. Fl. Mittel-Europ. 3: 310. taf. 101. fig. 2. u. fig. 579 (r, s, t). 1912; Fiori, Icon. Fl. Ital. 149. fig. 1203. 1921; Schischk. in Kom. Fl. USSR 6: 774. 1936; Bailey, Man. Cult. Pl. 381. 1949; Байтенов и Павлов в Павлов, Фл. Казахст. 3: 411. 1960; Barkoudah in Wentia 9: 144. pl. 15. fig. 46—51. 1962; Barkoudah et Chater in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 184. 1964; 东北草本植物志 3: 53. 1975.

一年生草本, 高 5—20 厘米。茎自基部开始分枝, 被微柔毛, 上部无毛。叶片线形, 长 5—25 毫米, 宽 1—2.5 毫米, 急尖或钝, 基部变狭, 苍白色。二歧聚伞花序疏散; 花梗细, 直挺, 长为花萼的多倍; 苞片叶状; 花萼倒圆锥筒状, 长 3—4 毫米, 宽 0.5—2.5 毫米, 萼齿裂至 1/4 或 1/3, 圆形, 顶端啮蚀状; 花瓣粉红色, 脉色较深, 倒卵状楔形, 长为花萼的 1.5—2 倍, 顶端啮蚀状; 雄蕊与花瓣等长或稍长; 子房卵球形, 花柱短。蒴果长圆形, 比宿存萼长; 种子细小, 多数, 歪卵形, 直径 0.3—0.5 毫米, 黑色, 具条状凸起。花期 5—10 月。

产黑龙江兴凯湖东岸。生于田间路旁草地或墙上。俄罗斯（西伯利亚、远东乌苏里）、哈萨克斯坦和欧洲也有。模式标本采自瑞典。

30. 金铁锁属* *Psammosilene* W. C. Wu et C. Y. Wu

W. C. Wu et C. Y. Wu in L. P. King. et al. Icon. Pl. Medic. e

Libro Tien-Nan-Pen-Tsao Lanmaoano 1: 1—2. tab. 1. 1945.

多年生草本。根倒圆锥形，肉质。茎铺散，多分枝。叶对生，叶片卵形，稍肉质，中脉明显；托叶缺。花两性，小形，几无梗，成三出二歧聚伞花序；花序密被腺毛；苞片2，草质；花萼筒状钟形，草质，纵脉15条，微凸，脉端不连结，萼齿5；雌雄蕊柄无；花瓣5，紫红色，狭匙形，全缘，爪渐狭；副花冠缺；雄蕊5，与萼片对生，花丝线形，花药背着；子房1室，具2倒生胚珠；花柱2。蒴果棒状，质薄，几不开裂；种子1，长倒卵形，背平，腹凸。

本属仅1种，特产我国西南。

属模式种：金铁锁 *Ps. tunicoides* W. C. Wu et C. Y. Wu

1. 金铁锁（滇南本草） 昆明沙参（植物名实图考），独钉子（昆明），土人参、金丝矮坨坨（滇南本草） 图版117: 1—10

Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu in L. P. King et al. Icon. Pl. Medic. e Libro Tien-Nan-Pen-Tsao Lanmaoano 1: 1—2. tab. 1. 1945; 中国高等植物图鉴1: 646. 图1291. 1972. ——*Silene cryptantha* Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 180. 1912; Hand. -Mazz., Symb. Sin. 7: 203. 1929, non Viviani (1824).

多年生草本。根长倒圆锥形，棕黄色，肉质。茎铺散，平卧，长达35厘米，2叉状分枝，常带紫绿色，被柔毛。叶片卵形，长1.5—2.5厘米，宽1—1.5厘米，基部宽楔形或圆形，顶端急尖，上面被疏柔毛，下面沿中脉被柔毛。三歧聚伞花序密被腺毛；花直径3—5毫米；花梗短或近无；花萼筒状钟形，长4—6毫米，密被腺毛，纵脉凸起，绿色，直达齿端，萼齿三角状卵形，顶端钝或急尖，边缘膜质；花瓣紫红色，狭匙形，长7—8毫米，全缘；雄蕊明显外露，长7—9毫米，花丝无毛，花药黄色；子房狭倒卵形，长约7毫米；花柱长约3毫米。蒴果棒状，长约7毫米；种子狭倒卵形，长约3毫米，褐色。花期6—9月，果期7—10月。

产四川、云南、贵州、西藏。生于金沙江和雅鲁藏布江沿岸，海拔2000—3800米的砾石山坡或石灰质岩石缝中。模式标本采自云南（丽江）。

根入药，治跌打损伤、胃疼。有毒！内服宜慎。

* 金铁锁属（滇南本草）。