

品,又作包装材料。

2. 莼亚科——Subfam. Cabomboideae

萼片及花瓣皆3—4,花瓣状,均宿存;雄蕊12—18,具侧向药;心皮不生在花托的穴内,每心皮有2—3胚珠;种子有内胚乳及外胚乳;叶椭圆矩形,叶柄及花梗无刺;花小形。

我国产1属,即莼属 *Brasenia* Schreb.。

2. 莼属——*Brasenia* Schreb.

Schreb. Gen. Pl. ed. 8. 1: 372. 1879; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 1: 46. 1862; Casp. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 6. 1888.

多年生水生草本;根状茎小,匍匐;茎细,多分枝,包在胶质鞘内。叶2型:漂浮叶互生,盾状,全缘,有长叶柄;沉水叶至少在芽时存在。叶柄及花梗有胶质物。花小,单生;萼片及花瓣均宿存;雄蕊12—18,花丝锥状,花药侧向;心皮6—18,离生,生在小形花托上,花柱短,柱头侧生,胚珠垂生。坚果革质。

仅1种,分布在亚洲东部、大洋洲、非洲西部及北美洲。

1. 莼菜(名医别录) 水案板(四川)

图2

Brasenia schreberi J. F. Gmel.

Syst. Veg. 1: 853. 1791; Kom. Fl.

URSS 7: 5. t. 1, f. 3. 1937; 裴鉴、单

人骅, 华东水生维管束植物 41. f. 49.

1952; 大井次三郎, 日本植物志 506. 1956;

江苏南部种子植物手册 270. f. 424. 1959;

中国高等植物图鉴 1: 647. f. 1293. 1972.——*B. purpurea* Casp. l. c. 6. f. 6.




图2 莼菜 *Brasenia schreberi* 1.叶;
2.花; 3.花纵剖。(冀朝祯绘)