

根状茎食用,又供药用,有强壮、净血作用;花供观赏。

2. 贵州萍蓬草

Nuphar bornetii Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. France 51: sess. Extraord. 143. 1904; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 24: 75. 1962.

和萍蓬草相近,但叶革质,圆形或心状卵形,长4.5—6.5厘米,基部弯缺约占全叶片1/3,裂片开展或重合,下面微有柔毛。花期5—7月,果期7—9月。

产贵州、江西。生在池沼中。模式标本产贵州青岩镇及平坝县。

3. 中华萍蓬草

Nuphar sinensis Hand.-Mazz. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Wien 1926: 1 et Symb. Sin. 7: 332. 1931.

多年水生草本。叶纸质,心状卵形,长8.5—15厘米,基部弯缺约占叶片的1/3,裂片开展,下面边缘密生柔毛,有的部分近无毛;叶柄长约40厘米,基部有膜质翅,具长柔毛。花直径5—6厘米;萼片矩圆形或倒卵形,长2厘米;花瓣宽条形,长7毫米,先端微缺;柱头盘13裂,离生且远离,超出柱头边缘。浆果直径2厘米;种子卵形,长约3毫米,浅褐色。花果期5—9月。

产湖南、江西、贵州。生在池塘中。模式标本产湖南长沙附近。

本种和欧亚萍蓬草相近,但后者叶革质,椭圆形,较大,长15—20厘米;叶柄三棱形;花较大,直径5—6厘米;柱头5—25裂,不超出柱头边缘。

4. 欧亚萍蓬草

Nuphar luteum (L.) J. E. Smith in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr. 1: 361. 1808—09; Kom. in Fl. URSS 7: 13. 1937; Fl. Europ. 1: 205. 1964. —*Nymphaea lutea* L. Sp. Pl. 510. 1753.

多年水生草本。根状茎粗,可达10厘米。叶近革质,椭圆形,长15—20厘米,宽10—18厘米,基部弯缺占叶片1/3—1/4,裂片开展,下面无毛或有柔毛,且有明显分叉脉;叶柄三棱形。花直径4—5厘米;萼片宽卵形至圆形,长2—3厘米;花瓣条形,长1—1.5厘米;柱头盘5—25裂,不达到柱头边缘。浆果长2—3厘米;种子卵形,长约5毫米。花期7—8月,果期9—10月。

产新疆。生在池沼中。几全部欧洲,苏联高加索和西伯利亚、伊朗、中亚有分布。

5. 台湾萍蓬草

Nuphar shimadai Hayata, Icon. Fl. Formos. 6: 2. pl. 1. 1916; Masamune, Short Fl. Formos. 63. 1931.