

多年水生草本；根状茎肥厚，直径 1—1.5 厘米。叶纸质，矩圆形或卵形，长 8—10 厘米，宽 7—8 厘米，基部箭状心形，裂片近三角形，近全缘，下面中部有少数长硬毛，越向边缘毛越密；叶柄长 15—30 厘米，基部膨大。花梗长 25—40 厘米；萼片倒卵形或匙状倒卵形，长约 2 厘米，稍不等；花瓣倒卵状菱形，长 6 毫米，先端截形或微缺；柱头盘具 10 裂片。浆果宽球形，长 17 毫米；种子卵形，长 4 毫米。花果期 12 月。

产我国台湾。生在池塘中。模式标本产新竹。

未见标本，自原始描述节译。本种未列入分种检索表内。

2. 金鱼藻科 —— CERATOPHYLLACEAE

多年生沉水草本；无根；茎漂浮，有分枝。叶 4—12 轮生，硬且脆，1—4 次二叉状分歧，条形，边缘一侧有锯齿或微齿，先端有 2 刚毛；无托叶。花单性，雌雄同株，微小，单生叶腋，雌雄花异节着生，近无梗；总苞有 8—12 苞片，先端有带色毛；无花被；雄花有 10—20 雄蕊，花丝极短，花药外向，纵裂，药隔延长成着色的粗大附属物，先端有 2—3 齿；雌蕊有 1 心皮，柱头侧生，子房 1 室，有 1 个悬垂直生胚珠，具单层珠被。坚果革质，卵形或椭圆形，平滑或有疣点，边缘有或无翅，先端有长刺状宿存花柱，基部有 2 刺，有时上部还有 2 刺；种子 1 个，具单层种皮，胚乳极少或全无。

仅 1 属，即金鱼藻属 *Ceratophyllum* L.

金鱼藻属 —— *Ceratophyllum* L.

L. Sp. Pl. 922. 1753 et Gen. Pl. ed. 5. 428. 1754; Benth. et Hook. Gen. Pl. 3: 415. 1880; Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2), 12. 1891.

特征同科。

全世界约 7 种，广泛分布，我国产 5 种。

为金鱼饲料，又作家禽、家畜饲料。

分 种 检 索 表

1. 叶 1—2 次二叉状分歧。

2. 果实有 3 刺：顶生 1 个，基部以上 2 个（广泛分布）……… 1. 金鱼藻 *C. demersum* L.
2. 果实有 5 刺：顶生 1 个，近先端 $1/3$ 处有 2 短刺，基部附近有 2 长刺（黑龙江、辽宁、湖北、台湾）……… 2. 五刺金鱼藻 *C. oryzetorum* Komar.
1. 叶 3—4 次二叉状分歧。
3. 叶的一回及二回裂片条形，宽约 1 毫米，末回裂片丝状；坚果有 3 刺，边缘有窄翅，表面具少数疣状突起（湖北）……… 3. 宽叶金鱼藻 *C. inflatum* Jao
3. 叶的裂片丝状或细丝状，宽 0.2—0.4 毫米。
4. 坚果边缘有翅，具 3 刺：顶生 1 个，基部以上 2 个（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）………
- ……… 4. 东北金鱼藻 *C. manschuricum* (Miki) Kitag.
4. 坚果边缘无翅，具 1 极短刺（福建、台湾、云南）……… 5. 细金鱼藻 *C. submersum* L.

1. 金鱼藻 细草、软草（四川）、灯笼丝（广西） 图 6

Ceratophyllum demersum L. Sp. Pl. 992. 1753; DC. Prodr. 3: 73. 1828;
Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 639. 1888; Leandri in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine
5: 1052. f. 120, 1—4. 1931; Kuzeneva in Kom. Fl. URSS 7: 15. pl. 2, f. 2.

1937; Van Steenis, Fl. Males. ser.

1. 4; 41. f. 1. 1949; 裴鉴、单人骅,
华东水生维管束植物 39. f. 47. 1952;
广州植物志 97. 1956; 江苏南部种子
植物手册 272. f. 428. 1959; 北京植
物志上册, 269. f. 217. 1962; 中国
高等植物图鉴 1: 649. f. 1298. 1972;
秦岭植物志 1 (2): 220. f. 188. 东
北草本植物志 3: 84. pl. 34. f. 5.
1975.

多年生沉水草本；茎长 40—150
厘米，平滑，具分枝。叶 4—12 轮生，
1—2 次二叉状分歧，裂片丝状，或丝
状条形，长 1.5—2 厘米，宽 0.1—0.5
毫米，先端带白色软骨质，边缘仅一
侧有数细齿。花直径约 2 毫米；苞片




图 6 金鱼藻 *Ceratophyllum demersum*
1. 植株一部分；2. 轮生叶；3. 果；4. 雄花。
(张泰利绘)

9—12，条形，长 1.5—2 毫米，浅绿色，透明，先端有 3 齿及带紫色毛；雄蕊 10—16，微
密集；子房卵形，花柱钻状。坚果宽椭圆形，长 4—5 毫米，宽约 2 毫米，黑色，平滑，边
缘无翅，有 3 刺，顶生刺（宿存花柱）长 8—10 毫米，先端具钩，基部 2 刺向下斜伸，长