

产四川西北部(马尔康)。生海拔 2400—3100 米的山坡,河边草地或丛林中。

根皮可作“丹皮”用。

四川牡丹与牡丹 *P. suffruticosa* 亲缘关系很近,但叶为三至四回三出复叶,叶裂片较小,两面无毛,花盘包住心皮 $1/2-2/3$,心皮无毛等,与后者易于区别。

3. 野牡丹 紫牡丹(中国树木分类学) 图版 5: 1—3

Paeonia delavayi Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 382. 1886; 陈嵘, 中国树木分类学 262. 1937; Stern, Stud. Gen. *Paeonia* 44. 1964; 方文培, 植物分类学报 7 (4): 303. 1958.

亚灌木,全体无毛。茎高 1.5 米;当年生小枝草质,小枝基部具数枚鳞片。叶为二回三出复叶;叶片轮廓为宽卵形或卵形,长 15—20 厘米,羽状分裂,裂片披针形至长圆状披针形,宽 0.7—2 厘米;叶柄长 4—8.5 厘米。花 2—5 朵,生枝顶和叶腋,直径 6—8 厘米;苞片 3—4 (—6),披针形,大小不等;萼片 3—4,宽卵形,大小不等;花瓣 9 (—12),红色、红紫色,倒卵形,长 3—4 厘米,宽 1.5—2.5 厘米;雄蕊长 0.8—1.2 厘米,花丝长 5—7 毫米,干时紫色;花盘肉质,包住心皮基部,顶端裂片三角形或钝圆;心皮 2—5,无毛。蓇葖长约 3—3.5 厘米,直径 1.2—2 厘米。花期 5 月;果期 7—8 月。

分布于云南西北部、四川西南部及西藏东南部。生海拔 2300—3700 米的山地阳坡及草丛中。模式标本采自云南丽江。

根药用,根皮(“赤丹皮”)可治吐血、尿血、血痢、痛经等症;去掉根皮的部分(“云白芍”)可治胸腹肋肋疼痛、泻痢腹痛、自汗盗汗等症(云南省药品标准)。

3b. 狭叶牡丹(变种) 保氏牡丹

Paeonia delavayi Franch. var. *angustiloba* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 318. 1913.—*P. potanini* Kom. in Not. Syst. Herb. Hort. Petrop. 2: 7. 1921; Stern, Stud. Gen. *Paeonia* 48. 1946; 方文培, 植物分类学报 7 (4): 305. 1958.

与野牡丹的主要区别:叶裂片狭窄,为狭线形或狭披针形,宽 4—7 毫米。

产四川西部(巴塘、雅江、乾宁、道孚)。生海拔 2800—3700 米的山坡灌丛中。模式标本采自四川康定。

用途同野牡丹。

3c. 黄牡丹(变种) 图版 5: 4

Paeonia delavayi Franch. var. *lutea* (Delavay ex Franch.) Finet et



1—3. 野牡丹 *Paeonia delavayi* 1.花枝;2.叶;3.雄蕊;
4.黄牡丹 *P. delavayi* var. *lutea* 叶。(冯晋庸绘)