

8—10. 1896.

须根细长,密被锈色短柔毛。茎高 20—45 厘米,无毛,不分枝或分枝。基生叶约 3 个,无毛,具长柄,花期之后多枯萎;叶片五角形,长 2—3 厘米,宽 3.2—5 厘米,中央全裂片宽菱形,在中部三深裂,边缘有小裂片和锯齿,侧全裂片斜扇形,不等二深裂近基部;叶柄长 6—10 厘米,基部有狭鞘。茎生叶约 4 枚,下部的有长柄,似基生叶,叶片较大,长 5.5—6 厘米,宽 7—9 厘米,上部的变小,有短柄。花直径约 1.8 厘米,无毛;萼片白色,倒卵形或椭圆形,长 9—10 毫米,宽 4—6 毫米,顶端圆或钝;雄蕊长 3.5—7.5 毫米,花药长 1—2 毫米;心皮 7—12 (—15),长 5—6 毫米,背面基部稍呈囊状。蓇葖长 7—14 毫米,宽约 4.5 毫米,喙长 1—1.7 毫米,直,突起位于果背面纵肋近中部处,正三角形;种子长约 2 毫米,黑色,有光泽。 5—6 月开花,7 月结果。

分布于云南西部、四川和湖北西部。生海拔 2400—3200 米间山地林下或草坡阴处。模式标本采自四川瓦山和湖北兴山。

全草供药用,治风湿麻木、鸡爪风、瘰癧等症(四川中药志)。

3. 多果鸡爪草 图版 13: 8—10

Calathodes polycarpa Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. 2: 153. 1933; 王文采, 植物分类学报 12: 156. 1974.


茎高 30—40 厘米,在中部以上有少数分枝,无毛。茎生叶形状与鸡爪草的相似;叶片长 4—8 厘米,宽 5—12 厘米,中央全裂片和侧全裂片的深裂片顶端渐尖或长渐尖,上面沿脉有极短的毛;叶柄长约 10 厘米,无毛,基部有狭鞘。花直径约 2.5 厘米,无毛;萼片白色,狭倒卵形或椭圆形,长约 10 毫米,顶端圆形;雄蕊长约 6.5 毫米,花药长约 2.2 毫米,顶端有小尖头;心皮 30—50,长约 4.5 毫米,背面近基部处稍呈囊状,花柱长约 1 毫米。蓇葖果长 7—8 毫米,喙长约 0.8 毫米,突起位于果背面纵肋的下部,狭三角形,长 3—3.5 毫米,向下弯曲。 6 月开花,8 月结果。

分布于云南东北部、贵州西部、湖北西南部和台湾。生海拔 1800—2000 米间山地林中或谷中沟边。模式标本采自台湾。

4. 金莲花属——*Trollius* L.

L. Sp. Pl. 556. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 243. 1754.

多年生草本。叶为单叶,全部基生或同时在茎上互生,掌状分裂。花单独顶生或少数组成聚伞花序,规则;花托稍隆起。萼片 5 片至较多数,花瓣状,倒卵形,通常黄



1—5. 鸡爪草 *Calathodes oxycarpa* 1. 开花的植株; 2. 萼片; 3. 心皮; 4. 雄蕊; 5. 聚合果。6—7. 黄花鸡爪草 *C. palmata* 6. 聚合果; 7. 蓇葖。8—10. 多果鸡爪草 *C. polycarpa* 8. 聚合果; 9. 蓇葖; 10. 种子。(王金凤绘)