

分 种 检 索 表

1. 苞片浅裂, 小裂片卵形; 花梗无毛; 心皮 5 枚, 有短柄, 无毛(四川西部) 1. 浅裂菟葵 *E. lobulata* W. T. Wang
1. 苞片深裂, 小裂片线形或披针形。
 2. 花梗无毛; 萼片白色; 心皮 4—5 枚, 无柄, 无毛(四川西部) ... 2. 白花菟葵 *E. albiflora* Franch.
 2. 花梗有毛; 萼片黄色; 心皮 6—9 枚, 有短柄, 被毛(东北) 3. 菟葵 *E. stellata* Maxim.

1. 浅裂菟葵 图版 23:6—7

***Eranthis lobulata* W. T. Wang**, 植物分类学报, 增刊 1: 53, 图版 1, 图 2. 1965.

根状茎球形, 直径约 5.5 毫米, 生多数须根。基生叶不存在或 1 个, 小, 长约 1.5 厘米, 有长柄; 叶片轮廓五角形, 长约 4.5 毫米, 宽约 9 毫米, 基部心形, 三浅裂, 中央浅裂片宽卵形, 顶端微钝, 侧浅裂片近楔形, 不等二浅裂, 无毛; 叶柄长约 8 毫米。花葶纤弱, 高 8.5—14.5 厘米, 粗约 1 毫米, 无毛; 苞片 6, 无柄, 倒卵形, 稀倒披针形, 长 1.1—1.4 (—1.9) 厘米, 宽 0.5—1.1 厘米, 顶端圆形或钝, 基部楔形, 在中部之上或在近中部处三浅裂, 稀不分裂, 中浅裂片卵形或近倒梯形, 顶端具短尖, 通常不分裂, 间或具三小裂片, 侧浅裂片较小, 卵形, 不分裂, 边缘全缘, 无毛。花梗在果期时长 0.8—1.3 厘米。心皮 5, 成熟时辐射状展开, 具短柄, 长 6—8 毫米, 无毛, 具不清晰的脉, 背部纵肋明显, 心皮柄长约 1 毫米, 喙长约 0.5 毫米; 种子椭圆球形, 稍扁, 长 1.2—1.5 毫米, 宽 1—1.2 毫米, 淡褐色, 光滑。5 月结果。

产四川西部汶川。生海拔 3100 米山地草坡。

2. 白花菟葵

***Eranthis albiflora* Franch.** in Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 2, 8: 191. 1872; Huth in Bot. Jahrb. 16: 297. 1893.

植株全体无毛。根状茎及基生叶均不详。花葶高 8—10 厘米; 苞片 5—6 个, 三全裂, 全裂片倒卵状楔形, 分裂至中部, 小裂片不等长, 线形, 顶端急尖或钝; 花具短梗, 直径 1.2—1.5 厘米; 萼片白色, 椭圆形, 顶端钝; 花瓣 4—5 个, 具长柄, 柄与瓣片等长, 瓣片倒心状漏斗形, 内面顶端边缘分裂, 外面顶端边缘微凹; 雄蕊约 10 枚, 比花瓣稍长, 花药圆形, 花丝线形, 顶端稍变宽; 心皮 4—5, 无柄, 子房狭长圆形, 顶端渐狭成花柱, 花柱短, 长不及子房长度之半。3 月开花。



1—5. 莞葵 *Eranthis stellata* 1. 开花的植株; 2. 结果的植株上部; 3. 花瓣; 4. 雄蕊;
5. 种子。6—7. 浅裂莞葵 *E. lobulata* 6. 结果的植株; 7. 种子。(冯晋庸绘)