

218. 1917; 中国高等植物图鉴 1: 696, 图 1392. 1972; 云南经济植物 387, 图 282. 1972.

与保山乌头的区别: 花序轴和花梗除了弯曲的白色短柔毛外还有开展的黄色腺毛; 子房密被黄色短柔毛。叶片草质、纸质, 稀革质, 长 (2.5—) 5.5—6.8 (—13) 厘米, 宽 (4.5—) 8.5—13 (—20) 厘米。花瓣有向后弯的短距。雄蕊无毛。

产云南邓川、贡山及巧家等地。生海拔 2550—3800 米间山地草坡。

块根有剧毒, 可药用, 治腰肌劳损, 风湿关节痛等症(云南中草药)。

无距小白撑(变型) 小黑牛(植物名实图考、云南腾冲) 图版 36: 4

*Aconitum nazarum* var. *heterotrichum* f. *dielsianum* (Airy-Shaw) W. T. Wang, st. nov. — *A. acaule* Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 270. 1912. — *A. dielsianum* Airy-Shaw in Kew Bull. 1932: 244. 1932. — *A. bullatifolium* var. *dielsianum* (Airy-Shaw) Fletcher et Lauener, in Not. Bot. Gard. Edinb. 20: 191. 1950; 云南经济植物 473. 1972.

与小白撑的区别: 花瓣无距。叶片草质或纸质。雄蕊无毛。子房密被淡黄色柔毛。

产云南腾冲、大理、丽江、贡山等地。生海拔 3500 米一带山地草坡或林边。

根有剧毒, 供药用, 可祛风湿, 镇痛(云南经济植物)。

光果小白撑(变型) 小黑牛(云南景东)

*Aconitum nazarum* var. *heterotrichum* f. *leiocarpum* (W. T. Wang) W. T. Wang, st. nov. — *A. bullatifolium* var. *leiocarpum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 93. 1965.

与小白撑的区别: 心皮无毛。叶片草质或纸质。花瓣有短距。雄蕊无毛。

产云南景东。生海拔 2500—3100 米间山地草坡。

35c. 宣威乌头(变种) 雪上一支蒿、草乌(宣威) 图版 35: 6—9

*Aconitum nazarum* var. *lasiandrum* W. T. Wang in Addenda. — *A. subrosulatum* Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 88. 1939.

与保山乌头的区别: 花丝上部被黄色短毛; 子房密被淡黄色短柔毛。块根胡萝卜形, 长约 5 厘米。茎高约 50 厘米。叶片革质或纸质, 肾形, 长达 4.2 厘米, 宽达 9 厘米。花序轴和花梗只被弯曲并紧贴的白色短柔毛。花瓣有短距。

产云南宣威一带。生海拔 2800 米。

块根可供药用。