

Li et Y. H. Huang, 东北草本植物志 3: 133, 图版 53, 图 6. 1975.—*A. tenuissimum* Nakai et Kitag. in Rep. Sci. Res. Manch. 1: 295. 1937.—*A. macrorhynchum* var. *viviparum* P. K. Chang et B. Y. Wang, 东北林学院标本室汇刊 2: 12. 1960.

与细叶乌头的区别：茎纤细，主茎横卧，侧枝顶端生不定根。心皮 5。

产黑龙江小兴安岭。生海拔 265 米一带的草甸上。

117. 长白乌头(东北草本植物志) 图版 61: 3—4; 图版 62: 6

***Aconitum tschangbaishchanense* S. H. Li et Y. H. Huang**, 东北草本植物志 3: 131, 图版 53, 图 7—11. 1975.

块根倒圆锥形，长 2.5—3.5 厘米，粗 6—7 毫米。茎高 85—140 厘米，下部变无毛，中部以上疏被反曲的短柔毛，等距离生叶。茎下部叶在开花时枯萎。茎中部叶有稍长柄；叶片肾状五角形，长 7—10 厘米，宽 10—12 厘米，基部心形，三全裂，中央全裂片菱形，长渐尖，羽状深裂近中脉，末回裂片线状披针形或线形，宽 2—4 毫米，通常全缘，表面沿稍下陷的脉被短柔毛，背面无毛；叶柄比叶片稍短，无毛。总状花序顶生或腋生，顶生的有 7—14 花，长 11—14.5 厘米；轴被反曲的短毛；下部苞片叶状，上部苞片线形；花梗长 2—5.5 厘米，密被伸展的柔毛；小苞片生花梗上部或中部附近，线形，长 5—10 毫米，宽 0.5—1 毫米；萼片蓝色，外面疏被短柔毛，上萼片高盔形或盔形，高 1.5—2 厘米，下缘稍凹自基部至喙长 1.1—1.5 厘米；花瓣无毛，瓣片长约 10 毫米，宽约 3.5 厘米，唇长约 6 毫米，距长约 1.5 毫米，向后弯曲；雄蕊无毛，花丝大多全缘；心皮 5，子房上部疏生短毛或无毛。

产吉林长白山区。生海拔 1000—1700 米间山地草坡或林边草地。

118. 高山乌头(东北植物检索表) 图版 61: 5—6; 图版 62: 7

***Aconitum monanthum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 23: 58. 1914;** 东北草本植物志 3: 135, 图版 54, 图 7—10. 1975.

块根胡萝卜形，长 1.5—2.5 厘米，粗约达 4 毫米。茎高 14—30 厘米，无毛，不分枝或有少数分枝。基生叶 1—2 枚，无毛，有长柄；叶片肾状五角形，长 2.5—3.5 厘米，宽 4—6.5 厘米，三全裂，中央全裂片菱形或宽菱形，细裂，末回裂片披针状线形或狭披针形，宽 1.5—2 毫米，侧全裂片斜扇形，不等二裂近基部；叶柄长 5—20 厘米，基部有短鞘。茎生叶 2—4 枚，与基生叶相似，但较小。花单独顶生或数朵形成聚伞花序；花梗长达 5 厘米，无毛；小苞片三裂或线形；萼片紫色，外面无毛，上萼片盔形，高 1.1—1.5 厘米，下缘长 1.4—2 厘米，稍凹，外缘近垂直，喙长 4—5 毫米，侧萼片长 1—1.4



1—2. 兴安乌头 *Aconitum ambiguum* 1. 植株上部; 2. 花瓣。3—4. 长白乌头 *A. tschangbai-schanense* 3. 茎生叶; 4. 花。5—6. 高山乌头 *A. monanthum* 5. 茎生叶; 6. 花。7—9. 宁武乌头 *A. ningwuense* 7. 茎生叶; 8. 花; 9. 花瓣。(1,3—6 自《东北草本植物志》)(刘春荣绘)



块根 (原大) 1. 兴安乌头 *A. ambiguum*; 2. 带岭乌头 *A. birobidshanicum*; 3. 光梗  
鸭绿乌头 *A. jaluense* var. *glabrescens*; 4. 圆锥乌头 *A. paniculigerum*; 5. 细叶乌头 *A.*  
*macrorhynchum*; 6. 长白乌头 *A. tschangbaishanense*; 7. 高山乌头 *A. monanthum*; 8.  
中甸乌头 *A. piepunense*; 9. 罂宁乌头 *A. legendri*; 10. 光序乌头 *A. leiostachyum*; 11.  
阿尔太乌头 *A. smirnovii*; 12. 德钦乌头 *A. ouvardianum*; 13. 展毛尖萼乌头 *A. acutius-*  
*culum* var. *aureopilosum*; 14. 工布乌头 *A. kongboense*。 (王文采绘)