

色或蓝紫色，外面无毛，上萼片盔形，有明显的爪，高约 1.7 厘米，自基部至喙长约 1.6 厘米，喙尖，下缘斜上方开展，凹，侧萼片长约 1.4 厘米；花瓣有短毛；唇长约 5 毫米，微凹，距长约 1.5 毫米，向内弯曲；雄蕊无毛，花丝全缘或有 2 小齿；心皮 3，无毛。

8—9 月开花。

产四川西部。生海拔 3700 米一带山地冷杉林边。模式标本采自四川小金附近。

124'. 长序乌头

Aconitum dolichostachyum W. T. Wang in Addenda.

茎高 1 米多，无毛，上部有短分枝。茎中部叶有稍长柄；叶片形状与工布鸟头的叶相似，心状五角形，长约 7.5 厘米，宽约 10 厘米，三全裂，中央全裂片菱状卵形，长渐尖，近羽状分裂，末回裂片狭三角形至线状披针形，表面沿稍下陷的叶脉疏被短伏毛，背面无毛；叶柄长约 7 厘米，无毛或近无毛。复总状花序狭塔形，长约 70 厘米，有数多花，顶生总状花序长 36—56 厘米，有 30—58 花；轴和花梗均无毛；下部苞片叶状，上部的小，三裂或线形；花梗长 1.8—6 厘米，向上方或斜上方直展；小苞片生花梗中部附近，线形，长 5—8 毫米，无毛，只基部花梗的呈叶状；萼片淡紫色，外面无毛，内面有稀疏长柔毛，上萼片高盔形，有短爪，高约 1.8 厘米，自基部至喙长约 1.5 厘米，下缘稍凹，外缘近垂直，有短喙，侧萼片斜宽倒卵形，长约 1.2 厘米，下萼片狭长圆形，长 1.1—1.3 厘米，宽 2—4 毫米；花瓣无毛或近无毛，瓣片长约 9 毫米，唇长约 3.5 毫米，末端微凹，距长约 2 毫米，向后下方弯曲，爪顶端膝状弯曲；雄蕊无毛，花丝全缘；心皮 3(—4)，无毛。8 月开花。

特产西藏工布江达。生海拔 3500 米一带高山草甸。

本种近密花鸟头 *A. potaninii*，但茎、花序均无毛，花瓣的爪顶端膝状弯曲，可以区别。也近光序乌头 *A. leiostachyum*，但上萼片高盔形，较高，下萼片狭长圆形，心皮 3(—4) 枚，而不同。

125. 兴安乌头(东北植物检索表) 图版 61: 1—2; 图版 62: 1

Aconitum ambiguum Reichb. Uebers. Gatt. Acon. 43. 1819; 东北草本植物志 3: 133, 图版 54, 图 1—5. 1975.—*A. ambiguum* f. *multisectum* S. H. Li et Y. H. Huang, 见前, 135. 1975.

茎高 (28—) 50—100 厘米，无毛，等距离生叶，不分枝或在花序之下有 1—2 条分枝。茎下部叶具长柄，在开花时枯萎。茎中部叶有稍长柄；叶片圆五角形，长 4.6—7 厘米，宽 6—12.5 厘米，三全裂，全裂片无柄；中央全裂片菱形，短渐尖，基部狭楔形，细裂近中脉，末回裂片披针形至线形，宽 2—4 毫米，侧全裂片斜扇形，不等二裂几达

基部，两面无毛；叶柄与叶片近等长，无毛。总状花序稀疏，有(1—)3—5花；轴和花梗无毛；下部苞片叶状，上部苞片三裂或线形；花梗长1—8.5厘米；小苞片生花梗上部，线形，长2.5—6.5毫米，宽0.3—1毫米；萼片紫蓝色，外面无毛，上萼片盔形，高1.3—1.5厘米，下缘向斜上方展出，弧状弯曲，长约1.5厘米，喙短，侧萼片长0.9—1.1厘米；花瓣无毛，瓣片长约7毫米，唇长约5毫米，宽约1毫米，距短，长不到1毫米，半球形；雄蕊无毛，花丝有2枚小齿；心皮3—5，无毛。8月开花。

在我国产黑龙江大兴安岭一带。生海拔400—450米间山地林下或林边。在苏联西伯利亚及蒙古人民共和国也有分布。

126. 工布乌头 图版62: 14; 图版65: 1—2

Aconitum kongboense Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 17, f. 1N, 4B. 1963; 西藏常用中草药 215, 图221. 1971.—*A. lhasaense* Lauener, l. c. 15.—*A. tsangpoense* Lauener, l. c. 16.—*A. viridiflorum* Lauener, l. c. 23.

块根近圆柱形，长8厘米，粗1.5厘米。茎直立，粗壮，高达180厘米，上部与花序均密被反曲的短柔毛，不分枝或分枝。叶心状卵形，多少带五角形，长及宽均达15厘米，三全裂，中央全裂片菱形，基部狭楔形，自中部向上近羽状深裂，深裂片线状披针形或披针形，侧全裂片斜扇形，不等二深裂近基部，两面无毛或沿脉疏被短柔毛；最下部叶柄与叶片等长，其他的则比叶片短的多。总状花序长达60厘米，有数花，与分枝的花序形成圆锥花序；下部苞片叶状，其他苞片披针形或钻形；花梗长1—10厘米，小苞片生花梗中部之上或中部附近，下部花梗的小苞片大，似叶，上部花梗的小，线形；萼片白色带紫色或淡紫色，外面被短柔毛，上萼片盔形，有时船状盔形，具短爪，高1.5—2厘米，自基部至喙长1.5—2厘米，下缘凹，外缘稍斜，喙三角形，长约5毫米，侧萼片长1.5厘米，下萼片长1.3—1.5厘米；花瓣疏被短毛，瓣片长约8毫米，唇长约3.5毫米，末端微凹，距长约2毫米，向后反曲；雄蕊无毛，花丝全缘；心皮3—4，无毛或疏被白色短柔毛。7—8月开花。

分布于西藏、四川西部。生海拔3050—3650米山坡草地或灌丛中。模式标本采自西藏工布江达附近。

块根泡酒后外擦可治跌打损伤、毒虫咬伤。(严禁内服)(西藏常用中草药)

126b. 展毛工布乌头(变种)

Aconitum kongboense var. *villosum* W. T. Wang in Addenda.—*A. rongchuense* Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 25: 15. 1963.



1—2. 兴安乌头 *Aconitum ambiguum* 1. 植株上部; 2. 花瓣。3—4. 长白乌头 *A. tschangbai-schanense* 3. 茎生叶; 4. 花。5—6. 高山乌头 *A. monanthum* 5. 茎生叶; 6. 花。7—9. 宁武乌头 *A. ningwuense* 7. 茎生叶; 8. 花; 9. 花瓣。(1,3—6 自《东北草本植物志》)(刘春荣绘)



块根 (原大) 1. 兴安乌头 *A. ambiguum*; 2. 带岭乌头 *A. birobidshanicum*; 3. 光梗
鸭绿乌头 *A. jaluense* var. *glabrescens*; 4. 圆锥乌头 *A. paniculigerum*; 5. 细叶乌头 *A.*
macrorhynchum; 6. 长白乌头 *A. tschangbaishanense*; 7. 高山乌头 *A. monanthum*; 8.
中甸乌头 *A. piepunense*; 9. 罂宁乌头 *A. legendri*; 10. 光序乌头 *A. leiostachyum*; 11.
阿尔太乌头 *A. smirnovii*; 12. 德钦乌头 *A. ouvardianum*; 13. 展毛尖萼乌头 *A. acutius-*
culum var. *aureopilosum*; 14. 工布乌头 *A. kongboense*。 (王文采绘)