

与工布乌头的区别：茎和花序的毛开展。

分布于四川西部、西藏东部。生海拔 4000 米一带山地。

127. 多花乌头 图版 66: 1—2

Aconitum polyanthum (Finet et Gagnep.) Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 99. 1939. — *A. napellus* L. var. *polyanthum* Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 513. 1904.

块根胡萝卜形，长可达 10 厘米。粗约 1 厘米。茎高达 2 米，几无毛，自下部起有多数向上斜展的长分枝，枝条疏被反曲的短柔毛。茎中部叶有稍长柄；叶片五角形，长及宽均约 9 厘米，三全裂，中央全裂片菱形，长渐尖，二回羽状深裂近中脉，小裂片披针状线形，宽 1.5—2.8 毫米，表面疏被短伏毛，背面只沿脉疏被短柔毛；叶柄长 4—7 厘米，疏被短柔毛或几无毛。顶生总状花序狭长，长达 60 厘米，约有 55 朵花；轴和花梗被反曲短柔毛；中部以下苞片叶状，上部苞片披针状线形；花梗长 1—7 厘米；小苞片生花梗中部之上，下部花梗的叶状，长约 1 厘米，中部以上花梗的线形至钻形，长 4.5—1.5 毫米；萼片蓝色，外面无毛，上萼片船状盔形，高约 1.4 厘米，自基部至喙长约 1 厘米，下缘向上斜展，喙短，侧萼片长约 9 毫米；花瓣无毛，瓣片长约 6 毫米，宽约 2 毫米，唇长约 3 毫米，微凹，距近球形，直径约 1 毫米；雄蕊无毛，花丝全缘；心皮 4，无毛。7 月开花。

产四川西部(康定，新都桥一带)。生海拔 3500 米山地溪边灌丛中。

127b. 毛萼多花乌头(变种)

Aconitum polyanthum var. *puberulum* W. T. Wang, 植物分类学报, 增刊 1: 89. 1965.

与多花乌头的区别：萼片外面有弯曲的短柔毛；花瓣的爪有疏毛。

产西藏东部(丁青)。生海拔 4000 米一带山地。

128. 光序乌头 图版 62: 10; 图版 65: 6—8

Aconitum leiostachyum W. T. Wang in Addenda.

块根胡萝卜形，长约 4.5 厘米，粗 6 毫米。茎高 80—100 厘米，无毛，等距离生叶。基生叶和茎最下部叶在开花时枯萎。其他下部叶有长柄；叶片五角形，长约 5 厘米，宽约 6 厘米，基部心形，三裂近基部，中央裂片菱形或卵状菱形，渐尖，近羽状深裂，二回裂片具 1—2 枚小裂片或不分裂，小裂片狭卵形或线状披针形，宽 2—2.8 毫米，微钝，两面疏被短柔毛；叶柄长约 9 厘米，被极为稀疏的伸展短柔毛，具短鞘。总状花序长约 35 厘米，约有 40 朵花；轴和花梗无毛；上部苞片小，线形，其他的苞片叶状；花



1—2. 多花乌头 *Aconitum polyanthum* 1. 茎中部叶; 2. 花序; 3. 花瓣。4—6. 缺刻乌头 *A. inciaofidum* 4. 茎中部叶; 5. 花; 6. 花瓣。7—9. 冕宁乌头 *A. legendrei* 7. 茎中部叶; 8. 花; 9. 花瓣。(冯育庸绘)