

毛；叶柄长4—7厘米。伞房花序有(1—)2—6花；苞片叶状；轴和花梗密被反曲的短柔毛；花梗长1.4—5.5厘米，近直展；小苞片生花梗中部之上或上部，有时不存在，狭线形，偶而狭长圆形，长4—12(—18)毫米，宽0.5—1.2(—2.2)毫米；萼片宿存，蓝紫色，外面疏被短柔毛，上萼片近圆形，长1.8—2厘米，侧萼片长约2厘米，下萼片最大，长2—2.4厘米，距钻形，长1.8—2.2厘米，基部粗约3毫米，末端稍向下弯曲或呈镰刀状弯曲；花瓣无毛，顶端微凹；退化雄蕊的瓣片黑色，宽椭圆形，长约8毫米，二浅裂，腹面有淡黄色髯毛，爪与瓣片近等长，基部有附属物；花丝无毛或有疏柔毛；心皮3，子房密被短柔毛。蓇葖长约1.7厘米；种子三棱形，长约1.5毫米，沿稜有狭翅。8—9月开花。

产西藏拉萨一带。生海拔4000—5000米间山地草坡。

本种近巴塘翠雀花 *D. batangense*，但叶的一回裂片不互相覆压，顶端稍渐尖，小苞片不与花邻接，下萼片倒卵形可以区别。

27. 大通翠雀花 下冈哇(青海藏族)

Delphinium pylzowii Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. 9: 709. 1876; Fl. Tang. 21, pl. 3. 1889; Huth in Bot. Jahrb. 20: 408. 1895; Stapf in Curtis's Bot. Mag. 145: t. 8813. 1919; 王文采, 植物学报 10: 78. 1962; 中国高等植物图鉴 1: 701, 图 1401. 1972.

茎高(10—)20—55厘米，自下部或中部分枝，稀不分枝，被反曲的短柔毛。基部叶在开花时多枯萎。下部叶具长柄；叶片圆五角形，长1—2.8厘米，宽2.5—5厘米，三全裂，中全裂片一回三裂或常二至三回近羽状细裂，小裂片稀疏，狭披针形至线形，两面疏被短柔毛；叶柄长3.5—7.5厘米，基部近无鞘。伞房花序有2—6花；基部苞片叶状，上部的三裂或不分裂而呈钻形；花梗长4.5—9厘米，密被反曲或开展的短柔毛，并混有黄色腺毛；小苞片生花梗中部上下，线形或钻形，长3—7毫米；萼片宿存，蓝紫色，卵形，长1.6—1.8(—2.4)厘米，外面有白色柔毛，内面无毛，距钻形，长2.1—2.4厘米，上部粗约3毫米，末端向下弯曲；花瓣无毛，顶端微凹；退化雄蕊的瓣片黑褐色，长6—9毫米，二裂达中部，腹面被黄色髯毛，爪与瓣片近等长；雄蕊无毛；心皮5，子房密被柔毛。蓇葖长约1.8厘米；种子倒圆锥状四面体形，长约1毫米，沿稜近无翅。7—8月开花。

分布于青海东部和甘肃西部。生海拔2350—3000米间山地草坡。模式标本采自青海大通一带。

地上部分药用，治肠炎腹泻、肝病等症。