

27b. 三果大通翠雀花(变种) 图版 87: 1—5

Delphinium pylzowii var. *trigynum* W. T. Wang, 植物学报 10: 78. 1962; 青藏高原药物图鉴 1: 172, 图 74. 1972.——*D. labrungense* Ulbr. ex Rehd. et Kobuski in Journ. Arn. Arb. 14: 11. 1933, nom. nud.

与大通翠雀花的区别: 心皮 3。叶的中全裂片二至三回细裂。萼片颜色较淡, 常呈淡灰蓝色。

分布于西藏东部、四川西北部、青海南部和东南部、甘肃西南部。生海拔 3500—4500 米间高山草甸。模式标本采自甘肃夏河。

全草供药用, 可治肠炎(青藏高原药物图鉴)。

《青藏高原药物图鉴》第一册, 图 74 是三果大通翠雀花的图, 可以参考。

28. 奇林翠雀花

Delphinium candelabrum Ostf. in Hedin, South. Tibet 6: 80, pl. 2, f. 2—3. 1922.

茎埋于石砾中, 长约 6 厘米, 下部无毛, 上部有短柔毛。叶在茎露出地面处丛生, 有长柄; 叶片肾状五角形, 宽 1—2 厘米, 三全裂, 中全裂片宽菱形, 侧全裂片近扇形, 一至二回细裂, 小裂片线状披针形, 疏被短柔毛; 叶柄长 2—3.5 厘米。花梗约 3—6 条自茎端与叶丛同时生出, 长 5—7 厘米, 渐升, 上部密被黄色柔毛; 小苞片生花梗近中部处, 三裂, 裂片披针形; 花大; 萼片蓝紫色, 卵形, 长约 2 厘米, 外面有黄色短柔毛, 距比萼片稍长或与萼片近等长, 钻形, 直或稍向下弧状弯曲; 花瓣暗褐色, 疏被短毛或无毛, 顶端微凹; 退化雄蕊黑褐色, 近圆形, 二浅裂, 腹面有黄色髯毛, 爪与瓣片近等长, 基部有短附属物; 雄蕊无毛; 心皮 3, 子房被毛。8 月开花。

产西藏奇林湖、南木林一带。生海拔 5100—5300 米间山谷草地或多砂石山坡。

花供药用。

28b. 单花翠雀花(变种)

Delphinium candelabrum var. *monanthum* (Hand.-Mazz.) W. T. Wang, 植物学报 10: 78. 1962; 青藏高原药物图鉴 1: 98, 彩图 2. 1972.——*D. monanthum* Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 50, f. I, a. 1939; Munz in Journ. Arn. Arb. 48: 525, f. 10, B. 1967; 中国高等植物图鉴 1: 701, 图 1402. 1972.

与奇林翠雀花的区别: 叶裂片分裂程度较小, 小裂片较宽, 卵形, 彼此多邻接; 花瓣顶端全缘。萼片长 1.8—3 厘米, 距长 2—3 厘米。退化雄蕊常紫色, 有时下部黑褐色。