

《青藏高原药物图鉴》第一册,图 75 是白蓝翠雀花的图,可以参考。

31b. 贺兰翠雀花(变种) 乌药(贺兰山)

Delphinium albocoeruleum var. **przewalskii** (Huth) W. T. Wang, sp. nov.——*D. przewalskii* Huth in Bot. Jahrb. 20: 407. 1895; Munz in Journ. Arn. Arb. 48: 529 f. 10, F. 1967.

与白蓝翠雀花的区别:茎和花梗除了白色的短柔毛以外还有淡黄色的腺毛。萼片紫蓝色,长 1.4—2(—2.8) 厘米,距钻形,长 1.7—2 厘米。

产宁夏贺兰山。生海拔 1500—2000 米间山地。

全草煮水可杀死跳蚤和虱子。

32. 冀北翠雀花

Delphinium siwanense Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 8, 5: 162. 1893; Huth in Bot. Jahrb. 20: 410. 1893; Munz in Journ. Arn. Arb. 48: 491, f. 7, c. 1967.——*D. cheilanthum* auct. non Fisch.; Franch. Pl. David. 1: 22. 1884.

茎高约 1 米,无毛,多分枝,等距地生叶。茎下部叶在开花时枯萎,中部叶有稍长柄;叶片五角形,长 2.8—8 厘米,宽 4.8—13 厘米,三全裂近基部,中央全裂片三深裂或不裂,侧全裂片扇形,不等二深裂,二回裂片不等二至三裂,末回小裂片稀疏,披针形至条形,宽 2.5—6 毫米,两面均被白色短伏毛;叶柄长 4.5—10 厘米。伞房花序有 2—7 花,顶端 5—6 朵常排列成伞状;苞片三裂或不裂而呈线形;花梗长 1.5—3 厘米,密被反曲而贴伏的白色短柔毛;小苞片生花梗中部上下,线形或钻形,长 2.5—5 毫米;萼片宿存,蓝紫色,椭圆状卵形,长 1.2—1.7 厘米,外面被短柔毛,距钻形,比萼片稍长,长 1.6—1.8 厘米,直或末端稍向下弯曲;花瓣上部黑褐色,无毛;退化雄蕊的瓣片黑褐色,有时上部蓝色,二浅裂,腹面中央有淡黄色髯毛;雄蕊无毛;心皮 3,子房有短柔毛。蓇葖长约 1.2 厘米;种子圆锥形,长约 1.5 毫米,暗褐色,密生鳞状横翅。 8—9 月开花。

产河北北部。生海拔 1300—2100 米间山地草坡或河滩灌丛中。模式标本采自北京附近山地。

32b. 细须翠雀花(变种) 图版 87: 9—14

Delphinium siwanense var. **leptopogon** (Hand.-Mazz.) W. T. Wang, sp. nov.——*D. leptopogon* Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 58. 1939; 王文采,植物学报 10: 80. 1962; Munz in Journ. Arn. Arb. 49: 149, f. 17,