

分布于湖北北部和河南东南部(鸡公山至商城一带)。生海拔400—800米间山地。模式标本采自河南商城。

亚组5. 二郎山翠雀花亚组——**Subsect. Erlangshanica** W. T. Wang, 植物学报 10: 86. 1962.

叶全裂,裂片细裂。花序总状。花闭合。萼片的脉不明显;距比萼片稍长,钻形。1种。

43. 二郎山翠雀花 图版 86: 6—8

Delphinium erlangshanicum W. T. Wang, 植物学报 10: 86. 1962;
Munz in Journ. Arn. Arb. 49: 74. 1968.

植株高约30厘米。叶约4枚,均基生,有长柄,无毛;叶片圆形,宽6.5—9厘米,三全裂,中央全裂片菱状卵形,侧全裂片二深裂近基部,二至三回细裂,末回裂片线形,宽1.5—2.5毫米,边缘干时稍反卷,表面脉下陷;叶柄长14—18厘米,基部具短宽鞘。花茎直立,被反曲的白色短柔毛。总状花序疏生约6朵花;轴与花梗被与花茎相同的毛,还混生有少数黄色短腺毛;基部苞片披针形,长2.2厘米,其他的苞片披针状长圆形或披针形,长1.3—1.6厘米;花梗长1.8—6厘米,向上近直展,稍弯曲;小苞片与花邻接,披针形,长1—1.1厘米,宽1.6—1.8毫米;萼片淡蓝紫色,卵形或椭圆状卵形,外面被短柔毛,内面无毛,长1.4—1.6厘米,距钻形,长1.9—2.1厘米,基部粗3.5—4毫米,自中部向下镰状弯曲;花瓣黑色,顶端二裂,裂片披针形,疏被缘毛;退化雄蕊的瓣片黑色,二深裂,腹面基部以上疏被长柔毛,爪比瓣片短;雄蕊无毛;心皮3,子房密被短柔毛。9月开花。

产四川天全二郎山。生海拔2300米山坡岩石上。

组3. 滇川翠雀花组——**Sect. 3. Pogonanthus** W. T. Wang, 植物学报 10: 137. 1962.

基生叶通常不存在,茎生叶4—10,下部的通常在开花时枯萎,掌状深裂或全裂,一回裂片通常浅裂,小裂片通常卵形或狭卵形。花序总状,稀伞房状。萼片脱落,蓝色、紫色或白色,脉不明显。退化雄蕊与萼片同色;瓣片卵形、长圆形或圆倒卵形,二裂或不分裂,腹面中央通常有髯毛,基部之上有2小突起。心皮3(—5)。种子偶而四面体形,只沿稜有狭翅,通常卵球形或椭圆球形,密生鳞状横翅。

亚组1. 粗距翠雀花亚组——**Subsect. Pachycentra** W. T. Wang, 植物学报 10: 137. 1962.

退化雄蕊多为倒卵形,不分裂或二浅裂。种子只沿稜有翅。心皮3或5。



1—2. 宽萼翠雀花 *Delphinium pseudopulcherrimum* 1. 花序; 2. 退化雄蕊。3—5. 美叶翠雀花 *D. calophyllum* 3. 花; 4. 基生叶; 5. 退化雄蕊。6—8. 二郎山翠雀花 *D. erlangshanicum* 6. 花; 7. 基生叶; 8. 退化雄蕊。(张泰利绘)