

55. 河南翠雀花 图版 93: 5—7

Delphinium honanense W. T. Wang, 植物学报 10: 146. 1962; Munz in Journ. Arn. Arb. 49: 100. 1968.

茎高 48—58 厘米, 无毛, 不分枝, 等距地生叶。基生叶在开花时枯萎。茎下部及中部叶有较长柄; 叶片五角形, 长 6—7 厘米, 宽 7—10 厘米, 三深裂至距基部约 8 毫米处, 中央深裂片菱形, 顶端急尖或短渐尖, 中部以下全缘, 中部之上边缘有三角形粗牙齿, 不分裂或三浅裂, 侧深裂斜扇形, 不等二深裂, 表面有少数糙毛, 背面沿脉网疏被糙毛; 叶柄长为叶片的 1.5—2 倍, 有少数开展的糙毛。总状花序长 8—11 厘米, 约有 10 花; 下部苞片三裂, 其他苞片披针状线形至线形, 长 0.8—1.7 厘米; 轴和花梗被反曲的短柔毛和开展的黄色短腺毛; 花梗斜上展, 长 0.8—2.6 厘米; 小苞片生花梗中部或下部, 线形, 长 5—8 毫米, 宽 0.5 毫米; 花近平展; 萼片紫色, 椭圆状卵形, 长 1.5—1.6 厘米, 外面疏被短柔毛, 距钻形, 长 2—2.1 厘米, 基部粗 3 毫米, 稍向下弯曲; 花瓣干时黄色, 无毛; 退化雄蕊紫色, 瓣片近方形, 二深裂, 腹面有黄色髯毛, 爪与瓣片近等长; 雄蕊无毛; 心皮 3, 无毛。 5 月开花。

分布于河南西南部、陕西东南部和南部、湖北西部。生海拔 600—1900 米间山地林下。模式标本采自河南西峡。

本种很近淡紫翠雀花 *D. handelianum*, 这二种叶的中深裂片都不分裂或不明显三浅裂; 本种叶的中深裂下部边缘直, 叶脉网不明显, 退化雄蕊的瓣片二深裂而与后者不同。

55b. 毛梗翠雀花 云雾七(陕西平利)

Delphinium honanense var. *piliferum* W. T. Wang, 秦岭植物志 1(2): 261. 1974.

与河南翠雀花的区别: 茎较高, 1 米左右, 上部分枝; 茎下部叶掌状五深裂; 花梗无黄色腺毛, 只被白色柔毛。

产陕西东南部。生山地草坡。模式标本采自陕西山阳。

根供药用, 治头痛、腰背痛等症(陕西中草药)。

《陕西中草药》图 457 是毛梗翠雀花的图, 可以参考, 在这书中, 拉丁名被误定为 *Delphinium giraldii* Diels.

56. 峨眉翠雀花 峨山草乌(四川) 图版 93: 1—4

Delphinium omeiense W. T. Wang in Addenda.—*D. davidii* auct. non Franch.; 陈封怀于方文培, 峨眉植物图志 2: 图版 61. 1944; 四川中药志 2:



1—4. 峨眉翠雀花 *Delphinium omeiense* 1. 植株全形; 2. 退化雄蕊; 3. 蓇葖; 4. 种子。5—7. 河南翠雀花 *D. honanense* 5. 叶; 6. 花; 7. 退化雄蕊。8—11. 黑水翠雀花 *D. potaninii* 8. 腋生花序; 9. 退化雄蕊; 10. 蓇葖; 11. 种子。(赵宝恒、张泰利绘)