

川康定。

根泡酒后服用可打风毒。

107b. 青海翠雀花(变种)

Delphinium tatsienense var. **chinghaiense** W. T. Wang, 植物分类学报 12: 159. 1974.

与康定翠雀花的区别: 叶的小裂片宽 0.5—1.5 毫米; 萼片两面均被短柔毛。

产青海东南部(班玛)。生海拔 4000 米山地。

108. 矮翠雀花

Delphinium pumilum W. T. Wang, 植物学报 10: 267. 1962.

茎高 10—16.5 厘米, 与叶柄均疏被开展的白色柔毛, 在基部之上有 1 叶, 通常不分枝。基生叶 3—4, 有长柄, 叶片五角状肾形, 长 0.7—1.4 厘米, 宽 1.3—2.4 厘米, 三全裂, 中央全裂片菱状倒卵形, 三深裂近中脉, 深裂片披针状线形, 宽 1—2 毫米, 多不裂, 有时侧深裂片有 1 小裂片, 侧全裂片扇形, 不等二深裂近基部, 表面有短伏毛, 背面疏被开展的绢状柔毛; 叶柄长 2—6 厘米, 基部有短鞘。伞房状花序有 (1—) 2 (—3) 花; 苞片叶状或线形; 花梗长 2—9 厘米, 被开展和反曲的白色柔毛和黄色腺毛; 小苞片生花梗中部上下, 线状钻形, 长 3—4.5 毫米; 萼片蓝色, 椭圆形或椭圆状倒卵形, 长 1.2—1.4 厘米, 外面疏被短柔毛, 距钻形, 长 3.3—3.8 厘米, 稍向上弯曲; 花瓣蓝色, 无毛, 顶端微凹; 退化雄蕊蓝色, 瓣片宽倒卵形, 长约 6 毫米, 顶端微凹, 腹面有黄色髯毛, 爪与瓣片近等长; 雄蕊无毛; 心皮 3, 子房有短柔毛。 9 月开花。

产四川西南部(木里)。生海拔 3900—4300 米山地草坡。

109. 软毛翠雀花 图版 106: 9—10

Delphinium mollipilum W. T. Wang, 植物学报 10: 268. 1962.

茎高约 34 厘米, 疏被开展或向下斜展的白色柔毛, 等距地生叶, 不分枝。茎中部叶有稍长柄, 叶片五角形, 长约 3.3 厘米, 宽约 6 厘米, 三全裂, 全裂片 1—3 回细裂, 小裂片线形, 宽约 3.5 毫米, 表面几无毛, 背面疏被开展的长柔毛; 叶柄约与叶片等长, 被与茎相同的毛, 有不明显的鞘。茎上部叶变小, 具短柄。伞房花序约含 2 花; 基部苞片叶状; 花梗长 3.1—3.6 厘米, 被开展的柔毛, 在上部毛很密; 小苞片生花梗中部, 线形, 长 4.5—6 毫米, 宽 0.5 毫米; 萼片紫蓝色, 长圆状倒卵形或长圆形, 长 1.6—1.7 厘米, 外面疏被短柔毛, 距钻形, 长约 2.5 厘米, 基部粗约 2 毫米, 直; 花瓣干时黄色, 无毛, 顶端微凹; 退化雄蕊蓝色, 瓣片圆倒卵形, 顶端微凹, 腹面有黄色髯毛, 爪比瓣片短, 基部有短附属物; 雄蕊无毛; 心皮 3, 子房只在上部疏被柔毛。 9 月开花。