

组 1. 还亮草组——Sect. *Anthriscifolium* W. T. Wang, 植物学报 10: 277. 1962.

叶羽状分裂。种子球形,有横膜翅。

1 种,分布于我国秦岭以南。越南北部也有分布。

113. 还亮草(植物名实图考) 鱼灯苏、车子野茺荑(浙江天目山) 图版 107: 1—6

*Delphinium anthriscifolium* Hance in Journ. Bot. 5: 207. 1868; Huth in Bot. Jahrb. 20: 422. 1895; 江苏南部种子植物手册 275, 图 433. 1959; 王文采, 植物学报 10: 277. 1962; Munz in Journ. Arn. Arb. 48: 260. 1967; 中国高等植物图鉴 1: 709, 图 1417. 1972.——*D. cavaleriense* Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 11: 49. 1902.——*D. cerefolium* Lévl. et Vant. l.c.——*D. anthriscifolium* f. *latilobulatum* W. T. Wang, 植物学报 10: 279. 1962.

茎高(12—)30—78 厘米,无毛或上部疏被反曲的短柔毛,等距地生叶,分枝。叶为二至三回近羽状复叶,间或为三出复叶,有较长柄或短柄,近基部叶在开花时常枯萎;叶片菱状卵形或三角状卵形,长 5—11 厘米,宽 4.5—8 厘米,羽片 2—4 对,对生,稀互生,下部羽片有细柄,狭卵形,长渐尖,通常分裂近中脉,末回裂片狭卵形或披针形,通常宽 2—4 毫米,表面疏被短柔毛,背面无毛或近无毛;叶柄长 2.5—6 厘米,无毛或近无毛。总状花序有(1—)2—15 花;轴和花梗被反曲的短柔毛;基部苞片叶状,其他苞片小,披针形至披针状钻形,长 2.5—4.5 毫米;花梗长 0.4—1.2 厘米;小苞片生花梗中部,披针状线形,长 2.5—4 毫米;花长 1—1.8(—2.5) 厘米;萼片堇色或紫色,椭圆形至长圆形,长 6—9(—11) 毫米,外面疏被短柔毛,距钻形或圆锥状钻形,长 5—9(—15) 毫米,稍向上弯曲或近直;花瓣紫色,无毛,上部变宽;退化雄蕊与萼片同色,无毛,瓣片斧形,二深裂近基部;雄蕊无毛;心皮 3,子房疏被短柔毛或近无毛。蓇葖长 1.1—1.6 厘米;种子扁球形,直径 2—2.5 毫米,上部有螺旋状生长的横膜翅,下部约有 5 条同心的横膜翅。 3—5 月开花。

分布于广东、广西、贵州、湖南、江西、福建、浙江、江苏、安徽、河南、山西南部。生海拔 200—1200 米间丘陵或低山的山坡草丛或溪边草地。模式标本采自广东南部。

全草供药用,治风湿骨痛,外涂治痈疮癣癩(浙江天目山药用植物志)。

113b. 卵瓣还亮草(变种) 图版 107, 图 9—12

*Delphinium anthriscifolium* var. *calleryi* (Franch.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 471. 1904.——*D. calleryi* Franch. in Bull. Soc.



1—6. 还亮草 *Delphinium anthriscifolium* 1. 植株下部; 2. 植株上部; 3. 花瓣; 4. 退化雄蕊; 5. 蓇葖; 6. 种子。7—8. 大花还亮草 *D. anthriscifolium* var. *majus* 7. 花; 8. 退化雄蕊。9—12. 卵瓣还亮草 *D. anthriscifolium* var. *calleryi* 9—11. 退化雄蕊; 12. 果序。(赵宝恒、张泰利绘)