

向下弯曲；花瓣的瓣片三浅裂，中裂片极小，长约1毫米，侧裂片较大，圆卵形，宽约4毫米；雄蕊长约2.5毫米，花药长约0.2毫米；子房被白色短柔毛。蓇葖长0.9—1.2厘米，直，有开展的柔毛，网脉明显隆起；种子长约1.8毫米。4—5月开花。

产新疆西部。生海拔700米左右一带草地。在伊朗、阿富汗、苏联高加索和中亚地区也有分布。

3. 唐松草亚科——Subfam. *Thalictroideae* Heintze, *Corm. fylog.* 1927.

多年生草本，少有一年草本。雄蕊向心发育。花盘不存在。心皮有多数、少数或1颗胚珠。蓇葖或蒴果。染色体小型，基数为7、9。

有3族，在我国均有分布。

• 1. 耧斗菜族——Trib. *Isopyreae* Schröd. in *Abhandl.*

d. *Zool.-Bot. Ges. Wien* 4. 1909

多年生、少有一年生草本。一至二回三出复叶。单歧聚伞花序，或花单生。花瓣不存在或存在，在存在时常为特化的分泌器官。胚珠少数或多数。蓇葖，有横脉。染色体基数为7。

8属，在我国均有分布，其中，尾囊草属 *Urophyssa* 特产我国，人字果属 *Dichocarpum*、耧斗菜属 *Aquilegia* 等属的原始群或类型分布于我国。

15. 拟扁果草属——*Enemion* Rafin.

Rafin. in *Journ. Phys.* 91: 70. 1820; Drumm. et Hutch.

in *Kew Bull.* 1920: 159. 1920.

多年生草本。根状茎短而不明显，生多数细长的根。叶基生和茎生，为二回三出复叶。花辐射对称，单生或数朵组成伞形花序，花序下有总苞。萼片5，花瓣状，白色，椭圆形。花瓣不存在。雄蕊多数，花药椭圆形，花丝丝形，但在上部变宽。心皮3—6。蓇葖椭圆形，花柱宿存，形成短喙；种子少数，卵形至椭圆形，种皮具皱折。

含5种，分布于北美，亚洲东北部。我国有1种，分布于辽宁、吉林及黑龙江。