

顶端具一细喙，表面具凸起的网脉；种子4—14粒，狭卵形，深褐色或近黑色，表面具小疣状突起。

1种，分布于亚洲北部和欧洲。在我国分布于东北至西北。

可供药用。

1. 蓝堇草(东北植物检索表) 图版110: 6—10

Leptopyrum fumarioides (L.) Reichb. Consp. 192. 1828; Drumm. et Hutch. in Kew. Bull. 1920: 159. 1920; 中国高等植物图鉴 1: 671, 图1341. 1972; 东北草本植物志 3: 101, 图版41. 1975.——*Isopyrum fumarioides* L. Sp. Pl. 557. 1753; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 407. 1904.

直根细长，粗径2—3.5毫米，生少数侧根。茎(2—)4—9(—17)条，多少斜升，生少数分枝，高8—30厘米。基生叶多数，无毛；叶片轮廓三角状卵形，长0.8—2.7厘米，宽1—3厘米，三全裂，中全裂片等边菱形，长达12毫米，宽达11毫米，下延成的细柄，常再三深裂，深裂片长椭圆状倒卵形至线状狭倒卵形，常具1—4个钝锯齿，侧全裂片通常无柄，不等二深裂；叶柄长2.5—13厘米。茎生叶1—2，小。花小，直径3—5毫米；花梗纤细，长3—30毫米；萼片椭圆形，淡黄色；长3—4.5毫米，宽1.7—2毫米，具3条脉，顶端钝或急尖；花瓣长约1毫米，近二唇形，上唇顶端圆，下唇较短；雄蕊通常10—15，花药淡黄色；长0.5毫米左右，花丝长约2.5毫米；心皮6—20，长约2毫米，无毛。蓇葖直立，线状长椭圆形，长8—10毫米；种子4—14粒，卵球形或狭卵球形，长0.5—0.7毫米。5—6月开花，6—7月结果。


在我国分布于新疆、青海东北部、甘肃、陕西、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江。生海拔100—1440米间的田边、路边或干燥草地上。在朝鲜、苏联西伯利亚地区、蒙古和欧洲也有分布。

药用，可治疗心血管疾病，有时用于治疗胃肠道疾病和伤寒(东北草本植物志)。

18. 人字果属——*Dichocarpum* W. T. Wang et Hsiao

W. T. Wang et Hsiao. 植物分类学报 9: 323. 1964; Tamura et Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 28: 270. 1967.

多年生直立草本，具根状茎。叶基生及茎生，或全部基生，为鸟趾状复叶或一回三出复叶，顶生一回指片简单。花序为简单或复杂的单歧或二歧聚伞花序；苞片三浅裂至三全裂。花辐射对称，两性。萼片5片，花瓣状，通常白色，罕淡黄色或粉红色，



1—5. 匍根扁果草 *Isopyrum anemonoides* 1. 植株; 2. 萼片; 3. 雄蕊; 4. 花瓣; 5. 聚合果。6—10. 蓝
 堇草 *Leptopyrum fumarioides* 6. 植株; 7. 花; 8. 花瓣; 9. 雄蕊; 10. 蓇葖; 11. 种子。(王金凤绘)