

2.5 毫米;心皮长约 3 毫米,宽 0.5 毫米,花柱很短。蓇葖 2 枚两叉状分开,长约 9 毫米,宽 2.5 毫米,基部合生;种子约 10 颗,球形,直径 0.75 毫米,背部稍具龙骨状突起。

产我国台湾。

9. 纵肋人字果 图版 114: 1—3

*Dichocarpum fargesii* (Franch.) W. T. Wang et Hsiao, 植物分类学报 9: 329. 1964; 秦岭植物志 1 (2): 233, 图 199. 1974. — *Isopyrum fargesii* Franch. in Morot, Journ. Bot. 11: 294. 1897; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 405, pl. 4, f. 16. 1904; Drumm. et Hutch. in Kew Bull. 1920 165, f. 5, A. 1920; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 270. 1931.


植物全体无毛。茎高 14—35 厘米,中部以上分枝。根状茎粗而不明显,生多数须根。叶基生及茎生,基生叶少数,具长柄,为一回三出复叶,叶片草质,轮廓卵圆形,宽 1.8—3.5 厘米;中央指片肾形或扇形,长 5—12 毫米,宽 7—16 毫米,顶端具 5 浅牙齿,牙齿顶端微凹,叶脉明显,侧生指片轮廓斜卵形,具 2 枚不等大的小叶,上面小叶斜倒卵形,长 6—14 毫米,宽 4—10 毫米,下面小叶卵圆形,长及宽均 5—9 毫米;叶柄长 3—8 厘米,基部具鞘;茎生叶似基生叶,渐变小,对生,最下面一对的叶柄长 1.2—4.2 厘米。花小,直径 6—7.5 毫米;苞片无柄,三全裂;花梗纤细,长 1—3.5 厘米;萼片白色,倒卵状椭圆形,长 4—5 毫米,顶端钝;花瓣金黄色,长约为萼片之半,瓣片近圆形,中部合生成漏斗状,顶端近截形或近圆形,下面有细长的爪;雄蕊 10,花药宽椭圆形,黄白色,长约 0.3 毫米,花丝长 3—4 毫米,中部微变宽。蓇葖线形,长 1.2—1.5 厘米,顶端急尖,喙极短而不明显;种子约 9 粒,椭圆球形,长 1.5—1.8 毫米,具纵肋。 5—6 月开花,7 月结果。

分布于四川东部、贵州、湖北西部、河南西南部、陕西南部和甘肃东南部。生海拔 1300—1600 米间山谷阴湿处。模式标本采自四川城口。

19. 拟梭斗菜属——*Paraquilegia* Drumm. et Hutch.

Drumm. et Hutch. in Kew Bull. 1920: 156. 1920.

多年生草本。根状茎较粗壮,外皮黑褐色。叶多数,全部基生,为一至二回三出复叶,有长柄,叶柄基部扩大成叶鞘,其外围有数层的老叶柄残基;叶柄残基密集呈枯草丛状,质较坚硬。花萼 1—3 条,直立;苞片对生或偶互生,倒披针形至线状倒披针



1—3. 纵肋人字果 *Dichocarpum fargesii* 1. 植株; 2. 花瓣; 3. 种子。4—6. 小花人字果 *D. franchetii* 4. 植株; 5. 花瓣; 6. 雄蕊。(冯晋庸绘)