

月开花, 8—10 月结果。

在我国分布于西藏西部、新疆、青海北部、甘肃(祁连山)和宁夏(贺兰山)。生海拔 2600—3400 米间的山地岩石缝或山区草原中。在蒙古和苏联中亚地区也有分布。

2. 拟楼斗菜 榆莫得乌锦(西藏藏族), 益母宁精(四川西北藏族), 假楼斗菜 图版 115: 1—5

Paraquilegia microphylla (Royle) Drumm. et Hutch. in Kew Bull. 1920: 157. 1920; Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 9: 212. 1925; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 270. 1931; 中国高等植物图鉴 1: 670, 图 1339. 1972.——*Isopyrum microphyllum* Royle, Ill. Bot. Himal. 54, t. 11, f. 4. 1839—40; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 376. 1866.——*I. grandiflorum* var. *microphyllum* (Royle) Finet et Gagnep. l. c. 51: 409. 1904.


根状茎细圆柱形至近纺锤形, 粗 2—6 毫米。叶多数, 通常为二回三出复叶, 无毛; 叶片轮廓三角状卵形, 宽 2—6 厘米, 中央小叶宽菱形至肾状宽菱形, 长 5—8 毫米, 宽 5—10 毫米, 三深裂, 每深裂片再 2—3 细裂, 小裂片倒披针形至椭圆状倒披针形, 通常宽 1.5—2 毫米, 表面绿色, 背面淡绿色; 叶柄细长, 长 2.5—11 厘米。花葶直立, 比叶长, 长 3—18 厘米; 苞片 2 枚, 生于花下 3—33 毫米处, 对生或互生, 倒披针形, 长 4—12 毫米, 基部有膜质的鞘; 花直径 2.8—5 厘米; 萼片淡堇色或淡紫红色, 偶为白色, 倒卵形至椭圆状倒卵形, 长 1.4—2.5 厘米, 宽 0.9—1.5 厘米, 顶端近圆形; 花瓣倒卵形至倒卵状长椭圆形, 长约 5 毫米, 顶端微凹, 下部浅囊状; 花药长 0.8—1 毫米, 花丝长 5—8.5 毫米; 心皮 5(—8) 枚, 无毛。蓇葖直立, 连同 2 毫米长的短喙共长 11—14 毫米, 宽约 4 毫米; 种子狭卵球形, 长 1.3—1.8 毫米, 褐色, 一侧生狭翅, 光滑。 6—8 月开花, 8—9 月结果。

在我国分布于西藏、云南西北部、四川西部、甘肃西南部、青海和新疆。生海拔 2700—4300 米间的高山山地石壁或岩石上。在不丹、尼泊尔、苏联中亚地区也有分布。

枝、叶药用, 治子宫出血等症(西藏常用中草药); 在四川西北部民间用根和种子治乳腺炎、恶疮痈疽等症。

20. 天葵属——*Semiaquilegia* Makino

Makinoin Bot. Mag. Tokyo 16: 119. 1902.



1—5.假楼斗菜 *Paraquilegia microphylla* 1.植株;2.花瓣;3.雄蕊;4.聚合果;5.种子。
6—12.尾囊草 *Urophysa henryi* 6.植株;7.花瓣;8.雄蕊;9.退化雄蕊;10.心皮;11.聚
合果;12.种子。13.距瓣尾囊草 *U. rockii* 花瓣。(冯晋庸绘)