

西南部。生海拔 100—1050 米间的疏林下、路旁或山谷地的较阴处。在日本也有分布。

本种的根叫“天葵子”，是一种较常用的中药材，有小毒，可治疗疮疖肿、乳腺炎、扁桃体炎、淋巴结核、跌打损伤等症。块根也可作土农药，防治蚜虫、红蜘蛛、稻螟等虫害(中国土农药志)。

21. 尾囊草属——*Urophysa* Ulbr.

Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 10: 868. 1929.

多年生草本。根状茎粗壮而带木质。叶均基生，呈莲座状，为单叶，掌状三全裂或近似一回三出复叶，有长柄，叶柄基部膨大呈鞘状。花葶通常数条，不分枝；聚伞花序有 1 或 3 花。花辐射对称，中等大，美丽。萼片 5，倒卵形至宽椭圆形，花瓣状，天蓝色或粉红白色，基部有短爪。花瓣 5，小，比萼片短 3—4 倍，基部囊状或有短距。雄蕊多数，花药椭圆形，花丝具 1 脉，下部线形，上部丝形。退化雄蕊约 7 枚，位于能育雄蕊之内侧，披针形，膜质。心皮 5(—6—8)，子房及花柱下部被短柔毛，花柱比子房约长 2 倍。蓇葖卵形，肿胀，具长而宿存的花柱；种子椭圆形，密生小疣状突起。

含 2 种，特产于我国四川、湖北西部、湖南北部和贵州。

尾囊草 *U. henryi* 可供药用，花美丽，可供观赏。

分 种 检 索 表

- 1. 聚伞花序通常有 3 朵花；花瓣无距，基部囊状；萼片长达 1.4 厘米 1. 尾囊草 *U. henryi* (Oliv.) Ulbr.
- 1. 聚伞花序通常只具单花；花瓣具短距；萼片长约 2 厘米 2. 距瓣尾囊草 *U. rockii* Ulbr.

1. 尾囊草 岩蝴蝶(贵州贵阳)，尾囊果 图版 115: 6—12

Urophysa henryi (Oliv.) Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 10: 870. 1929; Lauener et Green in Not. Bot. Gard. Edinb. 23: 595. 1961; 中国高等植物图鉴 1: 667, 图 1334. 1972.——*Isopyrum henryi* Oliv. in Hook. Ic. Pl. 8: t. 1745. 1888.——*Anemone boissiae* Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 11: 47. 1902.——*Aquilegia henryi* (Oliv.) Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. 51: 411. 1904.——*Isopyrum boissiae* (Lévl. et Vant.)