

形,距长1.6—2厘米,直或末端微弯,被短柔毛;雄蕊比瓣片短,花药黑色,长约1毫米;退化雄蕊白膜质,线状长椭圆形,长6—7毫米;心皮直立,密被短腺毛。蓇葖长1.5—2.1厘米,先端有长5—7毫米的宿存花柱;种子黑色,长约2毫米,具棱。6—8月开花,7—9月结果。

分布于西藏东南部、云南西北部及四川西南部。生海拔2500—3500米间的山地杂木林下或路旁。模式标本采自四川木里。

3. 小花楼斗菜(东北植物检索表) 血见愁(黑龙江漠河)

Aquilegia parviflora Ledeb. in Mém. Acad. Sci. St-Petersb. 5: 544. 1815; Bul. in Fl. URSS 7: 88, t. 7, f. 2. 1937; Munz in Gent. Herb. 7: 27, f. 4. 1946; 东北植物检索表 76, 图版12, 图4. 1959; 东北药用植物志 74. 1959; 东北草本植物志 3: 107, 图版44, 图7—8. 1975.

根圆柱形,灰褐色。茎高15—45厘米,不分枝或在上部少分枝,无毛,通常无叶。基生叶少数,为二回三出复叶;叶片轮廓三角形,宽5—12厘米,中央小叶无柄或具1—3毫米的短柄,倒卵形至倒卵状楔形,长1.6—3.5厘米,宽1.1—2.2厘米,近革质,顶端三浅裂,浅裂片圆形,全缘或有时具2—3粗圆齿,侧面小叶通常无柄,二浅裂,与中央小叶近等长或稍短,表面绿色,无毛,背面淡绿色,疏被短柔毛或无毛,边缘稍内卷;叶柄长4—14厘米,无毛。花3—6朵,近直立;苞片线状深裂;花梗长2—4厘米;萼片开展,蓝紫色,罕为白色,卵形,长1.5—2厘米,宽0.9—1.2厘米,顶端钝;花瓣瓣片钝圆形,长3—5毫米,具短距,距长3—5毫米,末端直或微弯;雄蕊比萼片短,花药黄色;退化雄蕊狭椭圆形,白膜质,长5—6毫米,边缘皱曲;心皮5,被腺状柔毛。蓇葖长1.2—2.3厘米,直立,被长柔毛,顶端有一细长的喙;种子黑色,长约2毫米。六月开花。

在我国分布于黑龙江北部。生林缘,开阔的坡地或林下。在苏联西伯利亚东部、蒙古及日本北部也有分布。

本种带根的全草在黑龙江民间供药用,治妇女病。

4. 腺毛楼斗菜

Aquilegia moorcroftiana Wall. Cat. n. 4713. 1830; in Royle, Ill. Bot. Himal. 1: 55, f. 21. 1834; Munz in Gent. Herb. 7: 88. 1949.

根粗壮,圆柱形,外皮黑褐色。茎直立,高20—40厘米,粗2—3毫米,被腺状柔毛。基生叶数枚,有长柄,二回三出复叶;叶片宽5—7厘米,中央小叶楔状宽倒卵形至扇形,长1.5—2厘米,宽度大于长度,三深裂,裂片具2—3个粗圆齿,侧生小叶斜