

尖,无毛;花瓣紫色,无毛,瓣片长方形,长7—8毫米,距长1.2—1.5厘米,末端向内螺旋状弯曲;雄蕊长5—9毫米,花药长圆形,长约1毫米;退化雄蕊披针形,长约5毫米,有柔毛和腺毛;花柱长5—6毫米。蓇葖长1.4—1.5厘米,变无毛。5—6月开花。

分布于陕西南部、甘肃南部、四川东北部。生海拔1000—2000米间山地沟边草地或山坡草地上。模式标本采自陕西宁陕。

根供药用,能去瘀生新、镇痛、祛风(陕西中草药)。

《秦岭植物志》第一卷,第二册,图202是秦岭耧斗菜的图,可以参考。

10. 暗紫耧斗菜

Aquilegia atrovinosa M. Pop. ex Gamajun in Фл. Казахст. 4: 28, T. 3, puc. 6. 1961; in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. Kasachst. 2: 12. 1964.

根细长圆柱形,粗4—8毫米,不分枝,外皮暗褐色。茎单一,直立,高30—60(—90)厘米,有纵槽,基部粗3—5.5毫米,被伸展的短柔毛。基生叶少数,为二回三出复叶;叶片轮廓宽卵状三角形,宽4—15厘米,中央小叶倒卵状楔形,长1.5—3.5厘米,宽1.2—2.8厘米,顶端三浅裂,浅裂片有2—3个粗圆齿,侧面小叶斜倒卵状楔形,不等二浅裂,表面绿色,无毛,背面粉绿色,被极稀疏的长柔毛或近无毛;叶柄长8—19厘米,被伸展的柔毛,基部变宽成鞘。茎生叶少数,具短柄,分裂情况似茎生叶。花1—5朵,直径3—3.5厘米;苞片线状披针形,长达1.6厘米;萼片深紫色,狭卵形,长约2.5厘米,宽8—9毫米,外面被微柔毛,顶端钝尖;花瓣与萼片同色,瓣片长约1.2厘米,距长约1.5厘米,末端弯曲;退化雄蕊白色,膜质,长约5.5毫米;雄蕊约与瓣片等长,花药宽椭圆形,黄色,长1.5—2毫米;子房密被毛。蓇葖长1.5—2.5厘米。5—7月开花。

在我国产新疆北部。生海拔1800米至3600米的山地杉林下,河谷或路旁。也分布于苏联哈萨克斯坦。

11. 白山耧斗菜(东北植物检索表)

Aquilegia japonica Nakai et Hara in Bot. Mag. Tokyo 49: 7. 1935; 东北草本植物志 3: 111, 图版44, 图6. 1975.——*A. amurensis* auct. non Kom.; 东北植物检索表 76, 图版12, 图6. 1959.

根细长圆柱形,不分枝,粗3—8毫米,外皮黑褐色。茎通常单一,直立,不分枝或有时在上部少分枝,高15—40厘米,疏被开展的白色短柔毛。叶全部基生,少数,为二回三出复叶;叶片宽2.5—8厘米,小叶卵圆形,长0.9—2.4厘米,宽1.3—3.3厘米